

INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site

www.tierarzneimittel.ch

NOTICE D'EMBALLAGE

Prevendog[®] S ad us. vet., collier pour petits chiens
Prevendog[®] M ad us. vet., collier pour chiens moyens
Prevendog[®] L ad us. vet., collier pour grands chiens

1 NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché: Virbac (Switzerland) AG, 8152 Opfikon.

Domicile: Postfach 353, 8152 Glattbrugg

Fabricant responsable de la libération des lots: AB7 Santé, Chemin des Monges, 31450 Deyme, France

2 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Prevendog S ad us. vet., collier pour petits chiens
Prevendog M ad us. vet., collier pour chiens moyens
Prevendog L ad us. vet., collier pour grands chiens

3 LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

1 collier gris contient:

Substance active:

	Longueur / poids	Deltaméthrine
Prevendog S pour petits chiens	35 cm / 15,9 g	0,64 g
Prevendog M pour chiens moyens	60 cm / 26,4 g	1,06 g
Prevendog L pour grands chiens	75 cm / 32,6 g	1,30 g

Collier gris contenant une substance active, en plastique, avec boucle de fermeture intégrée.

4 INDICATION(S)

Médicament vétérinaire contre les infestations de puces et de tiques, pour la prévention de la leishmaniose et pour réduire les piqûres de *Culex* (moustiques).

Chien:

- Prévention des infections par les puces (*Ctenocephalides felis*) pendant 4 mois,
- Prévention des infections par les tiques (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) pendant 6 mois,
- Prévention de la succion du sang par les phlébotomes (*Phlebotomus perniciosus*) pendant 5 à 6 mois (les phlébotomes transmettent les agents pathogènes de la leishmaniose lorsqu'ils sucent le sang),
- Prévention des piqûres de moustiques *Culex* (*Culex pipiens pipiens*) pendant 6 mois.

5 CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser chez les chiots de moins de 7 semaines.

Ne pas utiliser chez les chiens présentant des lésions cutanées étendues.

Ne pas utiliser chez les chiens présentant une hypersensibilité connue à la substance active ou un autre composant.

Ne pas utiliser chez les chats

La substance active du Prevendog est extrêmement toxique pour les chats. Prevendog ne doit en aucun cas être utilisé chez les chats. Des symptômes d'intoxication potentiellement mortels, tels que de fortes crampes musculaires et des troubles du mouvement, peuvent en résulter et entraîner la mort du chat.

6 EFFETS INDÉSIRABLES

Dans de rares cas, des réactions d'hypersensibilité peuvent entraîner des altérations locales de la peau, des rougeurs, du prurit et une chute de poils. Dans des cas extrêmement rares, des symptômes neurologiques tels que tremblements et apathie peuvent survenir. Dans de tels cas, le collier doit être enlevé. Les symptômes s'atténuent ensuite dans les 48 heures. Si les symptômes persistent, consulter un vétérinaire.

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit:

- très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 animaux traités)
- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités)
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1000 animaux traités)

- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités)
- très rare (moins d'un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés)

Si vous constatez des effets secondaires, notamment ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

7 ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chiens

8 POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

A usage externe.

Un collier par chien.

Le collier peut être utilisé à partir de l'âge de 7 semaines.

9 CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Retirer le collier de son enveloppe protectrice scellée, le dérouler (1) et le placer autour du cou du chien sans serrer (2). Laisser un espace de deux doigts entre le collier et le cou du chien (3). Passer l'extrémité dans la boucle et couper les restes qui dépassent de plus de 5 cm (4).

Le collier déploie son plein effet au bout d'une semaine et doit donc être mis en place de préférence une semaine avant une éventuelle infestation de l'animal.

Il convient d'empêcher le chien de nager pendant les 5 premiers jours suivant la mise en place du collier.

Le collier conserve son efficacité pendant une période de 4 mois (puces) ou jusqu'à 6 mois (tiques, phlébotomes, moustiques).



10 TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

11 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

À conserver à une température ne dépassant pas 30 °C.

Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la mention «EXP» sur la boîte.

12 MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières pour chaque espèce cible:

Outre le traitement de l'animal en particulier, il est recommandé de traiter également l'environnement du chien avec des produits appropriés pour lutter contre les puces. De rares cas de tiques restées plantées dans la peau du chien, malgré le collier, ont été observés.

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal:

Un contact occasionnel avec l'eau n'affecte pas l'efficacité du collier. Il est cependant recommandé de retirer le collier du chien avant qu'il ne se baigne, car la substance active est toxique pour les poissons et les autres organismes vivant dans l'eau.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux:

Ne pas laisser les enfants en bas âge manipuler et jouer avec le collier ni le prendre dans la bouche. Se laver les mains à l'eau froide et au savon après manipulation du collier.

Gestation et lactation:

Prevendog peut être utilisé chez les chiennes en gestation et en lactation.

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions:

Ne pas utiliser en même temps que d'autres médicaments contre les parasites externes.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes):

Si le chien ingère le collier, les symptômes suivants peuvent apparaître: incoordination des mouvements, tremblements, salivation, vomissements et rigidité des membres postérieurs. Ces symptômes disparaissent dans les 48 heures. En cas de symptômes persistants, consulter un vétérinaire.

13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

La substance active de Prevendog est toxique pour les poissons et les abeilles. Même après utilisation, le collier ne doit pas parvenir dans l'environnement ou dans les cours d'eau.

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14 DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

13.08.2024

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament vétérinaire aux adresses

www.swissmedic.ch et www.tierarzneimittel.ch.

15 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Boîte pliante contenant 1 collier, emballé dans un sachet en plastique/aluminium (tous les dosages ou toutes les tailles de collier)

Catégorie de remise D: remise sans ordonnance sur conseil spécialisé

Swissmedic 67'050

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché désigné à la rubrique 1.