

INFORMAZIONE PER PROPRIETARIE E PROPRIETARI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

www.tierarzneimittel.ch

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Prevendog[®] S ad us. vet., collare per cani di taglia piccola

Prevendog[®] M ad us. vet., collare per cani di taglia media

Prevendog[®] L ad us. vet., collare per cani di taglia grande

1 NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Titolare dell'omologazione: Virbac (Switzerland) AG, 8152 Opfikon. Domicilio: Postfach 353, 8152 Glattbrugg

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: AB7 Santé, Chemin des Monges, 31450 Deyme, Francia

2 DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Prevendog S ad us.vet., collare per cani di taglia piccola

Prevendog M ad us. vet., collare per cani di taglia media

Prevendog L ad us. vet., collare per cani di taglia grande

3 PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

1 collare grigio contiene:

Principio attivo:

	Lunghezza / peso	Deltametrina
Prevendog S per cani di taglia piccola	35 cm / 15,9 g	0,64 g
Prevendog M per cani di taglia media	60 cm / 26,4 g	1,06 g
Prevendog L per cani di taglia grande	75 cm / 32,6 g	1,30 g

Collare in plastica grigia, contenente un principio attivo, con fibbia a scatto integrata.

4 INDICAZIONE(I)

Medicamento veterinario contro le infestazioni da pulci e zecche, per la prevenzione della leishmaniosi e per ridurre le punture di zanzare Culex.

Cane:

- Prevenzione dell'infestazione da pulci (*Ctenocephalides felis*) per 4 mesi,
- prevenzione dell'infestazione da zecche (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) per 6 mesi,
- prevenzione della suzione di sangue da parte del cosiddetto "moscerino della sabbia" (flebotomo = *Phlebotomus perniciosus*) per un periodo di 5 – 6 mesi (i flebotomi trasmettono gli agenti patogeni della leishmaniosi quando succhiano il sangue),
- prevenzione delle punture di zanzare *Culex* (*Culex pipiens pipiens*) per 6 mesi.

5 CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare in cuccioli di età inferiore alle 7 settimane.

Non utilizzare in cani con lesioni cutanee estese.

Non utilizzare in cani con nota ipersensibilità al principio attivo o a un altro componente.

Non utilizzare nei gatti

Il principio attivo di Prevendog è estremamente tossico per i gatti. Prevendog non deve essere usato sui gatti in nessun caso. Possono verificarsi sintomi di avvelenamento pericolosi per la vita, come forti crampi muscolari e disturbi motori, che possono causare la morte del gatto.

6 EFFETTI COLLATERALI

In rari casi, le reazioni di ipersensibilità possono provocare alterazioni cutanee locali, eritema, prurito e perdita di pelo. Molto raramente possono verificarsi sintomi neurologici come tremori e apatia. In questi casi, il collare deve essere rimosso. I sintomi si attenuano entro 48 ore. Se i sintomi persistono, occorre consultare un veterinario.

La frequenza degli effetti collaterali è definita usando le seguenti convenzioni:

- molto comune (più di 1 su 10 animali trattati mostra effetti collaterali durante il trattamento)
- comune (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati)
- non comune (più di 1 ma meno di 10 animali su 1000 animali trattati)
- raro (più di 1 ma meno di 10 animali su 10 000 animali trattati)
- molto raro (meno di 1 animale su 10 000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne la veterinaria/il veterinario o la/il farmacista.

7 SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani

8 POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Per uso esterno.

Un collare per cane.

Il collare può essere utilizzato a partire dalle 7 settimane di età.

9 AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Il collare viene rimosso dal sacchetto di protezione sigillato, srotolato (1) e posizionato lasco intorno al collo del cane (2). Devono essere lasciate due dita di spazio tra il collare e il collo del cane (3). Far passare l'estremità attraverso la fibbia e tagliare l'eccesso a una distanza di almeno 5 cm (4).

Il collare sviluppa il suo effetto completo dopo una settimana e dovrebbe quindi essere applicato preferibilmente una settimana prima di una possibile infestazione degli animali.

Al cane deve essere impedito di nuotare per i primi 5 giorni dopo l'applicazione del collare.

Il collare rimane efficace per un periodo di 4 mesi (pulci) fino a 6 mesi (zecche, flebotomi, zanzare).



10 TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente.

11 PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore a 30 °C.

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sul contenitore con la dicitura «EXP».

12 AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:

Oltre a trattare i singoli animali, è consigliabile utilizzare prodotti antipulci adeguati nell'ambiente del cane. In rari casi, le zecche possono attaccarsi mentre il collare è indossato.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

Il contatto occasionale con l'acqua non pregiudica l'efficacia del collare, ma esso dovrebbe comunque essere tolto prima di ogni bagno dal momento che il principio attivo è tossico per i pesci ed altri organismi acquatici.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali:

Evitare che i bambini piccoli tocchino il collare, ci giochino o lo mettano in bocca. Dopo aver indossato il collare, le mani devono essere pulite con acqua fredda e sapone.

Gravidanza e allattamento:

Prevendog può essere utilizzato in cagne in gravidanza e in allattamento.

Interazione con altri medicinali e altre forme d'interazione:

Non utilizzare insieme ad altri medicinali contro i parassiti esterni.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

In caso di ingestione orale del collare da parte del cane, possono manifestarsi i seguenti sintomi: movimenti scoordinati, tremori, salivazione, vomito e rigidità degli arti posteriori. Questi sintomi si attenuano entro 48 ore. Se i sintomi persistono, occorre consultare un veterinario.

13 PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO

Il principio attivo di Prevendog è tossico per pesci e api. Anche dopo l'uso, il collare non deve essere disperso nell'ambiente o nei corpi idrici.

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere alla/al propria/o veterinaria/veterinario o alla/al propria/o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14 DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

13.08.2024

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15 ALTRE INFORMAZIONI

Scatola pieghevole con 1 collare, confezionato in un sacchetto di plastica-alluminio (tutti i dosaggi o tutte le misure di collare)

Categoria di dispensazione D: Dispensazione senza prescrizione previa consulenza specialistica

Swissmedic 67'050

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella rubrica 1.