

INFORMAZIONE PER PROPRIETARIE E PROPRIETARI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

www.tierarzneimittel.ch

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Evicto® 15 mg Spot-on ad us. vet., soluzione per applicazione topica cutanea per cani e gatti fino a 2,5 kg

Evicto® 30 mg Spot-on ad us. vet., soluzione per applicazione topica cutanea per cani da 2,6 a 5,0 kg

Evicto® 45 mg Spot-on ad us. vet., soluzione per applicazione topica cutanea per gatti da 2,6 a 7,5 kg

Evicto® 60 mg Spot-on ad us. vet., soluzione per applicazione topica cutanea per gatti da 7,6 kg a 10,0 kg

Evicto® 60 mg Spot-on ad us. vet., soluzione per applicazione topica cutanea per cani da 5,1 kg a 10,0 kg

Evicto® 120 mg Spot-on ad us. vet., soluzione per applicazione topica cutanea per cani da 10,1 kg a 20,0 kg

Evicto® 240 mg Spot-on ad us. vet., soluzione per applicazione topica cutanea per cani da 20,1 kg a 40,0 kg

Evicto® 360 mg Spot-on ad us. vet., soluzione per applicazione topica cutanea per cani da 40,1 kg a 60,0 kg

1 NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Titolare dell'omologazione: Virbac (Switzerland) AG, 8152 Opfikon. Domicilio: Postfach 353, 8152 Glattbrugg

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: Virbac, 1^{ère} avenue, 2065m – LID, 06510 Carros, Francia

2 DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Evicto Spot-on ad us. vet., soluzione per applicazione topica cutanea per cani e gatti

3 PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

1 pipetta contiene: **Principio attivo:**

	Selamectina (mg)	Contenuto della pipetta (ml)
Evicto 15 mg per cani e gatti ¹	15	0,25
Evicto 30 mg per cani ²	30	0,25
Evicto 45 mg per gatti ¹	45	0,75
Evicto 60 mg per gatti ¹	60	1
Evicto 60 mg per cani ²	60	0,5
Evicto 120 mg per cani ²	120	1
Evicto 240 mg per cani ²	240	2
Evicto 360 mg per cani ²	360	3

¹ Concentrazione della soluzione in alcool isopropilico: 6 %

² Concentrazione della soluzione in alcool isopropilico: 12 %

Eccipiente:

Butilidrossitoluene 0,8 mg/ml

Soluzione per applicazione cutanea.

Soluzione limpida, incolore a gialla.

4 INDICAZIONE(I)

Cani e gatti:

- Trattamento e prevenzione delle infestazioni da pulci per un periodo di un mese dopo una singola dose. L'effetto del medicamento veterinario è quello di uccidere le pulci adulte, le loro larve e le loro uova. Dopo la somministrazione, il medicamento veterinario esercita un'attività ovicida per un periodo di 3 settimane. Riducendo la popolazione delle pulci, il trattamento mensile degli animali in gravidanza e allattamento contribuisce anche a prevenire l'infestazione da pulci nella cucciolata. Il medicamento veterinario può essere utilizzato come parte della strategia di trattamento della dermatite allergica da pulci e i suoi effetti ovicidi e larvicidi possono contribuire a controllare l'infestazione da pulci nell'ambiente dell'animale.
- Prevenzione della filariosi cardiopolmonale causata da *Dirofilaria immitis* mediante trattamento mensile.
- Trattamento e prevenzione dell'infestazione da acari delle orecchie (*Otodectes cynotis*).

Gatti:

- Trattamento e prevenzione degli stadi intestinali di ascaridi (*Toxocara cati*) e anchilostomi (*Ancylostoma tubaeforme*).
- Trattamento e prevenzione dell'infestazione da pidocchi masticatori (*Felicola subrostratus*).

Cani:

- Trattamento e prevenzione dell'infestazione da pidocchi masticatori (*Trichodectes canis*).
- Trattamento e prevenzione della rogna sarcoptica (causata da *Sarcoptes scabiei*).
- Controllo e prevenzione degli ascaridi (*Toxocara canis*).

5 CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare in animali di età inferiore a 6 settimane. Questi dovrebbero essere protetti trattando l'animale madre.

Non utilizzare in gatti che presentano contemporaneamente un'altra malattia o che sono debilitati e sottopeso (per taglia ed età).

6 EFFETTI COLLATERALI

L'uso del medicamento veterinario nei gatti è associato, in casi isolati, a una lieve e temporanea alopecia nel sito di applicazione. In casi molto rari è stata osservata una temporanea irritazione localizzata. L'alopecia e l'irritazione normalmente regrediscono senza trattamento.

Molto raramente, come con altri antiparassitari della stessa classe di principi attivi, sono stati osservati disturbi temporanei del sistema neurologico, comprese le convulsioni, nei cani e gatti dopo la somministrazione del medicamento veterinario.

La frequenza degli effetti collaterali è definita usando le seguenti convenzioni:

- molto comune (più di 1 su 10 animali trattati mostra effetti collaterali durante il trattamento)
- comune (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati)
- non comune (più di 1 ma meno di 10 animali su 1000 animali trattati)
- raro (più di 1 ma meno di 10 animali su 10 000 animali trattati)
- molto raro (meno di 1 animale su 10 000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne la veterinaria/il veterinario o la/il farmacista.

7 SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani e gatti

8 POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Evicto deve essere applicato in un'unica volta per via esterna sulla pelle. Le seguenti tabelle definiscono le dimensioni delle pipette da utilizzare in base al peso corporeo (corrispondente ad almeno 6 mg di selamectina/kg di peso corporeo):

Gatti (kg di peso corporeo)	Quantità di selamectina	Designazione della pipetta da utilizzare
fino a 2,5	15 mg	Evicto 15 mg per cani e gatti fino a 2,5 kg
2,6 - 7,5	45 mg	Evicto 45 mg per gatti da 2,6 kg a 7,5 kg
7,6 - 10,0	60 mg	Evicto 60 mg per gatti da 7,6 kg a 10,0 kg
più di 10	Combinazione appropriata di pipette	

Cani (kg di peso corporeo)	Quantità di selamectina	Designazione della pipetta da utilizzare
fino a 2,5	15 mg	Evicto 15 mg per cani e gatti fino a 2,5 kg
2,6 - 5,0	30 mg	Evicto 30 mg per cani da 2,6 kg a 5,0 kg
5,1 - 10,0	60 mg	Evicto 60 mg per cani da 5,1 kg a 10,0 kg
10,1 - 20,0	120 mg	Evicto 120 mg per cani da 10,1 kg a 20,0 kg
20,1 - 40,0	240 mg	Evicto 240 mg per cani da 20,1 kg a 40,0 kg
40,1 - 60,0	360 mg	Evicto 360 mg per cani da 40,1 kg a 60,0 kg
più di 60	Combinazione appropriata di pipette	

Infestazione da pulci (gatti, cani): lotta e prevenzione

Somministrando Evicto si uccidono le pulci adulte presenti sull'animale, non vengono più prodotte uova vive e anche le larve vengono uccise (presenti solo nell'ambiente). In questo modo si blocca la riproduzione delle pulci, si interrompe il loro ciclo vitale e si contribuisce a controllare l'infestazione da pulci nell'ambiente dell'animale.

Per prevenire le infestazioni da pulci, il medicamento veterinario deve essere somministrato a intervalli mensili per tutta la stagione di attività delle pulci, iniziando un mese prima che le pulci diventino attive. La riduzione della popolazione delle pulci attraverso il trattamento mensile degli animali in gravidanza e allattamento aiuta anche a prevenire indirettamente l'infestazione della cucciolata fino all'età di 7 settimane.

Allergia alla saliva delle pulci (gatti, cani): Trattamento e controllo

Evicto è utilizzato per trattare e controllare l'infiammazione allergica della pelle causata dalle pulci nei cani e nei gatti. Come parte della strategia nel trattamento dell'allergia alla saliva delle pulci, il medicamento veterinario deve essere somministrato a intervalli mensili. Se gli animali soffrono di forte prurito, è necessario un trattamento sintomatico simultaneo.

Filariosi cardiopolmonare (gatti, cani): prevenzione

Per prevenire la filariosi cardiopolmonare, Evicto deve essere somministrato mensilmente nei paesi in cui è presente il vettore. Evicto può essere utilizzato tutto l'anno, ma deve essere somministrato almeno entro un mese dal primo contatto dell'animale con una zanzara. A questo segue un trattamento mensile fino alla fine della stagione di attività delle zanzare. L'ultima dose deve essere somministrata entro un mese dall'ultima esposizione alle zanzare. Qualora si salti accidentalmente un trattamento e si superi l'intervallo di un mese tra le applicazioni, la somministrazione immediata di Evicto e la ripresa del trattamento mensile consentirà di ridurre al minimo la possibilità che si sviluppino forme adulte di filaria. Se un altro medicamento veterinario viene sostituito da Evicto

nell'ambito di un programma di prevenzione della filariosi, la dose iniziale di Evicto deve essere somministrata entro un mese dall'ultima applicazione del medicamento veterinario precedentemente utilizzato. Evicto è ben tollerato negli animali affetti da filariosi. Tuttavia, si raccomanda nelle aree endemiche che tutti gli animali di età pari o superiore ai 6 mesi siano testati per la filaria prima di iniziare il trattamento con Evicto. Evicto non è efficace contro la filaria adulta, ma può ridurre il numero di larve (microfilarie) in circolazione nel sangue.

Infestazione da acari delle orecchie (gatti, cani): lotta e prevenzione

Per trattare le infestazioni da acari delle orecchie, il medicamento veterinario deve essere somministrato sulla cute nella zona tra le scapole e non deve essere fatto gocciolare nel condotto uditivo. Gatti: occorre somministrare una singola dose di Evicto. Cani: va somministrato un'unica volta. Prima di ogni trattamento rimuovere delicatamente il cerume dal condotto uditivo esterno. Si raccomanda un esame clinico dopo 30 giorni, poiché alcuni animali potrebbero richiedere un secondo trattamento.

Infestazione da pidocchi masticatori (gatti, cani): lotta e prevenzione

Evicto deve essere somministrato una volta come dose singola per eliminare l'infestazione da pidocchi (*Trichodectes canis* e *Felicola subrostratus*). Un'applicazione mensile di Evicto previene possibili infezioni da pidocchi masticatori.

Rogna sarcoptica (cani): trattamento e prevenzione

Per la completa eliminazione degli acari (*Sarcoptes scabiei*), somministrare Evicto due volte a distanza di un mese. Un'applicazione mensile di Evicto previene possibili infezioni da *Sarcoptes scabiei*.

Infestazione d'ascaridi nematodi (cani): trattamento e prevenzione

Evicto deve essere usato una volta come dose singola per il trattamento delle infestazioni d'ascaridi (*Toxocara canis*). L'infestazione d'ascaridi nematodi si previene con l'applicazione mensile di Evicto.

Infestazione d'ascaridi nematodi (gatti): trattamento e prevenzione


Evicto deve essere usato una volta come dose singola per il trattamento degli stadi intestinali degli anchilostomi (*Ancylostoma tubaeforme*) e degli ascaridi (*Toxocara cati*). L'uso mensile di Evicto consente di prevenire le infestazioni da anchilostoma e ascaridi.

Infestazione da pulci nei cuccioli e nei gattini durante l'allattamento: prevenzione

I cuccioli e i gattini possono essere protetti dall'infestazione da pulci trattando la madre. Questa deve essere trattata con Evicto due settimane prima e 10 giorni dopo il parto. In seguito, il trattamento deve essere continuato mensilmente. La selamectina è ben tollerata durante la gravidanza e l'allattamento. Non sono stati osservati effetti avversi né nei cuccioli o nei gattini né nelle loro madri.

9 AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Rimuovere la pipetta dalla bustina protettiva in alluminio immediatamente prima dell'uso.



- 1) Mantenendo la pipetta in posizione verticale rimuovere il tappo.
- 2) Capovolgere il tappo ed inserire l'altra estremità nella punta dell'applicatore. Premere il tappo verso il basso per forare il sigillo dell'applicatore. Togliere il tappo prima dell'applicazione.
- 3) Separare i peli nell'area del collo craniale alle scapole, per evidenziare una piccola zona di pelle. Posizionare la punta della pipetta direttamente sulla pelle, quindi premere più volte con forza la pipetta per svuotare l'intero contenuto sul sito di applicazione.

- Non massaggiare la zona di applicazione. Evitare il contatto del prodotto con le dita.
- Non utilizzare quando il pelo dell'animale è bagnato. Tuttavia, l'efficacia di Evicto non viene ridotta se l'animale viene lavato, esposto alla pioggia o nuota in acqua due o più ore dopo il trattamento.

10 TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente

11 PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale in un luogo asciutto per proteggerla dalla luce e dall'umidità. Questo medicamento veterinario non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione. Tenere i medicinali fuori dalla portata dei bambini.

12 AVVERTENZE SPECIALI

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

Non somministrare per via orale. Questo medicamento veterinario è destinato esclusivamente all'applicazione cutanea. Evitare il contatto diretto con l'animale trattato fino a quando il sito di applicazione non si sia asciugato. Durante questo periodo, inoltre, il cane non deve fare il bagno o nuotare.

In rari casi, l'applicazione del medicamento veterinario può causare una temporanea appiccicosità localizzata del pelo nel punto di applicazione e/o la comparsa di una piccola quantità di sostanza polverosa bianca. Si tratta di reazioni normali che scompaiono in genere entro 24 ore dal trattamento e che non compromettono la sicurezza o l'efficacia del medicamento veterinario.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali:

Non fumare, mangiare o bere durante la manipolazione del medicamento veterinario. Altamente infiammabile; tenere lontano da calore, scintille, fiamme libere o altre fonti d'accensione. Lavarsi le mani dopo l'uso. In caso di contatto del medicamento veterinario con la pelle, lavare immediatamente la parte interessata con acqua e sapone. In caso di contatto accidentale con gli occhi, sciacquarli immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico, mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

Evitare il contatto diretto con gli animali trattati finché l'area trattata non sia asciutta.

Il giorno del trattamento, i bambini non devono essere autorizzati a maneggiare gli animali trattati e gli animali non devono dormire con i loro proprietari, specialmente i bambini.

Smaltire immediatamente gli applicatori usati fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Gravidanza e allattamento:

Il medicamento veterinario può essere utilizzato negli animali da riproduzione e nelle gatte e cagne in gravidanza e allattamento.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

Non sono stati osservati effetti collaterali dopo la somministrazione di una dose del principio attivo di Evicto 10 volte superiore a quella raccomandata. Il principio attivo è stato somministrato fino a 3 volte la dose raccomandata in cani e gatti con infezioni da filarie cardiopolmonari adulte, senza osservare effetti collaterali. Il principio attivo è stato inoltre somministrato fino a 3 volte la dose raccomandata in gatti e cani riproduttori maschi e femmine, incluse femmine in gravidanza e allattamento, e fino a 5 volte la dose raccomandata del principio attivo in cani di razza Collie sensibili, senza osservare effetti collaterali.

13 PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO

Evicto non deve essere disperso in corsi d'acqua poiché può essere pericoloso per i pesci e gli altri organismi acquatici. Tenere gli animali trattati lontano dall'acqua per almeno due ore subito dopo l'applicazione. I contenitori vuoti e i farmaci inutilizzati devono essere smaltiti con i rifiuti domestici per evitare la contaminazione dei corsi d'acqua. È necessario assicurarsi che non sia possibile accedervi senza autorizzazione.

14 DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

13.08.2024

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15 ALTRE INFORMAZIONI

Evicto è disponibile in pipette di plastica (monodose).

Confezioni (tutte le dimensioni delle pipette):

Scatole pieghevoli con 4 pipette

Scatole pieghevoli con 24 pipette

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria

Swissmedic 67'234

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella rubrica 1.