

## INFORMATION FÜR TIERHALTERINNEN UND TIERHALTER

Fachinformation für Medizinalpersonen siehe [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

### PACKUNGSBEILAGE

Evicto® 15 mg Spot-on ad us. vet., Lösung zum Auftropfen für Hunde und Katzen bis 2,5 kg

Evicto® 30 mg Spot-on ad us. vet., Lösung zum Auftropfen für Hunde von 2,6 bis 5,0 kg

Evicto® 45 mg Spot-on ad us. vet., Lösung zum Auftropfen für Katzen von 2,6 bis 7,5 kg

Evicto® 60 mg Spot-on ad us. vet., Lösung zum Auftropfen für Katzen von 7,6 kg bis 10,0 kg

Evicto® 60 mg Spot-on ad us. vet., Lösung zum Auftropfen für Hunde von 5,1 kg bis 10,0 kg

Evicto® 120 mg Spot-on ad us. vet., Lösung zum Auftropfen für Hunde von 10,1 kg bis 20,0 kg

Evicto® 240 mg Spot-on ad us. vet., Lösung zum Auftropfen für Hunde von 20,1 kg bis 40,0 kg

Evicto® 360 mg Spot-on ad us. vet., Lösung zum Auftropfen für Hunde von 40,1 kg bis 60,0 kg

#### 1. NAME UND ANSCHRIFT DER ZULASSUNGSINHABERIN UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DER HERSTELLERIN, DIE FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber: Virbac (Switzerland) AG, 8152 Opfikon. Domizil: Postfach 353, 8152 Glattbrugg

Für die Chargenfreigabe verantwortliche Herstellerin: Virbac, 1<sup>ère</sup> avenue, 2065m – LID, 06510 Carros, Frankreich

#### 2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Evicto Spot-on ad us. vet., Lösung zum Auftropfen für Hunde und Katzen

#### 3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 Pipette enthält: **Wirkstoff:**

	Selamectin (mg)	Pipetteninhalt (ml)
Evicto 15 mg für Hunde und Katzen <sup>1</sup>	15	0,25
Evicto 30 mg für Hunde <sup>2</sup>	30	0,25
Evicto 45 mg für Katzen <sup>1</sup>	45	0,75
Evicto 60 mg für Katzen <sup>1</sup>	60	1
Evicto 60 mg für Hunde <sup>2</sup>	60	0,5
Evicto 120 mg für Hunde <sup>2</sup>	120	1
Evicto 240 mg für Hunde <sup>2</sup>	240	2
Evicto 360 mg für Hunde <sup>2</sup>	360	3

<sup>1</sup> Konzentration der Lösung in Isopropylalkohol: 6 %

<sup>2</sup> Konzentration der Lösung in Isopropylalkohol: 12 %

**Sonstiger Bestandteil:**

Butylhydroxytoluol 0,8 mg/ml

Lösung zum Auftropfen.

Klare, farblose bis gelbe Lösung.

**4. ANWENDUNGSGEBIET(E)**

Hunde und Katzen:

- Behandlung und Vorbeugung des Flohbefalls über einen Zeitraum von einem Monat nach Einzelgabe. Dies ist das Ergebnis der abtötenden Wirkungen des Tierarzneimittels auf erwachsene Flöhe, deren Larven und Eier. Nach der Verabreichung wirkt das Tierarzneimittel über einen Zeitraum von 3 Wochen eiabtötend. Über eine Reduktion der Flohpopulation unterstützt eine monatliche Behandlung von trächtigen und säugenden Tieren ebenfalls die Vorbeugung eines Flohbefalls des Wurfs. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie bei Flohspeichelallergie verwendet werden und durch seine ei- und larvenabtötende Wirkungen kann es dazu beitragen, die Besiedelung von Flöhen in der Umgebung des Tieres zu kontrollieren.
- Vorbeugung der Herzwurmerkrankung, verursacht durch *Dirofilaria immitis*, durch monatliche Behandlung.
- Behandlung und Vorbeugung des Ohrmilbenbefalls (*Otodectes cynotis*).

Katzen:

- Behandlung und Vorbeugung im Darm lebender Stadien von Spulwürmern (*Toxocara cati*) und Hakenwürmern (*Ancylostoma tubaeforme*).
- Behandlung und Vorbeugung des Befalls mit Haarlingen (*Felicola subrostratus*).

Hunde:

- Behandlung und Vorbeugung des Befalls mit Haarlingen (*Trichodectes canis*).
- Behandlung und Vorbeugung der Sarcoptesräude (verursacht durch *Sarcoptes scabiei*).
- Bekämpfung und Kontrolle von Spulwürmern (*Toxocara canis*).

**5. GEGENANZEIGEN**

Nicht anwenden bei Tieren, die jünger als 6 Wochen sind. Diese sollen durch Behandlung des Muttertieres geschützt werden.

Nicht anwenden bei Katzen, die gleichzeitig eine andere Erkrankung haben oder die geschwächt und untergewichtig (hinsichtlich Grösse und Alter) sind.

## 6. NEBENWIRKUNGEN

Die Anwendung des Tierarzneimittels bei Katzen ist in vereinzelt Fällen mit einem schwachen, vorübergehenden Haarverlust an der Auftragestelle verbunden. In sehr seltenen Fällen konnte eine vorübergehende örtlich begrenzte Reizung beobachtet werden. Haarverlust und Hautreizung klingen normalerweise ohne Behandlung wieder ab.

Sehr selten wurden nach Anwendung des Tierarzneimittels, wie bei anderen Antiparasitika derselben Wirkstoffklasse auch, vorübergehende Störungen des Nervensystems, einschliesslich Krampfanfälle, bei Hunden und Katzen beobachtet.

Die Angaben zur Häufigkeit von Nebenwirkungen sind folgendermassen definiert:

- Sehr häufig (mehr als 1 von 10 behandelten Tieren zeigen Nebenwirkungen)
- Häufig (mehr als 1 aber weniger als 10 von 100 behandelten Tieren)
- Gelegentlich (mehr als 1 aber weniger als 10 von 1000 behandelten Tieren)
- Selten (mehr als 1 aber weniger als 10 von 10 000 behandelten Tieren)
- Sehr selten (weniger als 1 von 10 000 behandelten Tieren, einschliesslich Einzelfallberichte).

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, beim behandelten Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrer Tierärztin / Ihrem Tierarzt oder Ihrer Apothekerin / Ihrem Apotheker mit.

## 7. ZIELTIERART(EN)

Hunde und Katzen

## 8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Evicto soll einmalig äusserlich auf der Haut angewendet werden. Die folgenden Tabellen definieren die zu verwendende Pipettengrösse in Abhängigkeit des Körpergewichtes (entsprechend mindestens 6 mg Selamectin/kg Körpergewicht):

<b>Katzen (kg Körpergewicht)</b>	<b>Menge an Selamectin</b>	<b>Bezeichnung der zu verwendenden Pipettengrösse</b>
bis 2,5	15 mg	Evicto 15 mg für Hunde und Katzen bis 2,5 kg
2,6 - 7,5	45 mg	Evicto 45 mg für Katzen von 2,6 bis 7,5 kg
7,6 - 10,0	60 mg	Evicto 60 mg für Katzen von 7,6 kg bis 10,0 kg
mehr als 10	Entsprechende Kombination der Pipetten	

Hunde (kg Körpergewicht)	Menge an Selamectin	Bezeichnung der zu verwendenden Pipettengrösse
bis 2,5	15 mg	Evicto 15 mg für Hunde und Katzen bis 2,5 kg
2,6 - 5,0	30 mg	Evicto 30 mg für Hunde von 2,6 bis 5,0 kg
5,1 - 10,0	60 mg	Evicto 60 mg für Hunde von 5,1 kg bis 10,0 kg
10,1 - 20,0	120 mg	Evicto 120 mg für Hunde von 10,1 kg bis 20,0 kg
20,1 - 40,0	240 mg	Evicto 240 mg für Hunde von 20,1 kg bis 40,0 kg
40,1 - 60,0	360 mg	Evicto 360 mg für Hunde von 40,1 kg bis 60,0 kg
mehr als 60	Entsprechende Kombination der Pipetten	

### ***Flohbefall (Katzen, Hunde): Bekämpfung und Vorbeugung***

Durch die Verabreichung von Evicto werden die am Tier befindlichen erwachsenen Flöhe abgetötet, keine lebensfähigen Eier mehr produziert und auch Larven (nur in der Umgebung zu finden) abgetötet. Dadurch wird die Vermehrung der Flöhe gestoppt, der Lebenszyklus der Flöhe unterbrochen und die Besiedlung von Flöhen in der Umgebung des Tieres unterstützend kontrolliert.

Zur Vorbeugung von Flohbefall sollte das Tierarzneimittel in monatlichem Abstand während der Dauer der Flohsaison verabreicht werden, beginnend einen Monat vor dem Aktivwerden der Flöhe. Die Reduktion der Flohpopulation durch monatliche Behandlung von trächtigen und säugenden Tieren hilft indirekt auch einem Befall des Wurfes bis zu einem Alter von 7 Wochen vorzubeugen.

### ***Flohspeichelallergie (Katzen, Hunde): Behandlung und Kontrolle***

Evicto dient zur Behandlung und Kontrolle der durch Flöhe hervorgerufenen allergischen Hautentzündung bei Hunden und Katzen. Als Teil der Behandlungsstrategie gegen die Flohspeichelallergie sollte das Tierarzneimittel in monatlichen Abständen verabreicht werden. Leiden die Tiere unter einem starken Juckreiz, so ist eine gleichzeitige symptomatische Behandlung erforderlich.

### ***Herzwurmerkrankung (Katzen, Hunde): Vorbeugung***

Um der Herzwurmerkrankung vorzubeugen, sollte in Ländern, in denen der Überträger existiert, Evicto monatlich verabreicht werden. Evicto kann das ganze Jahr über angewendet werden, sollte allerdings zumindest innerhalb eines Monats nach dem ersten Stechmücken-Kontakt des Tieres verabreicht werden. Hieran schliesst sich die monatliche Behandlung bis zum Ende der Stechmückensaison an. Die letzte Dosis muss innerhalb eines Monats nach dem letzten Mückenkontakt verabreicht werden. Sollte versehentlich eine Behandlung vergessen und so das einmonatige Intervall zwischen den Anwendungen überschritten werden, wird die Möglichkeit der

Entwicklung reifer Herzwürmer durch die sofortige Anwendung von Evicto und Wiederaufnahme der monatlichen Behandlung auf ein Minimum reduziert. Wenn im Rahmen eines Programms zur Vorbeugung der Herzwurmkrankheit ein anderes Tierarzneimittel durch Evicto ersetzt wird, dann muss die erste Dosis Evicto innerhalb eines Monats nach der letzten Applikation des zuvor verwendeten Tierarzneimittels verabreicht werden. Evicto ist bei Tieren mit einer Herzwurminfektion gut verträglich. Es wird jedoch empfohlen, dass in Verbreitungsgebieten alle Tiere im Alter von 6 Monaten oder älter auf bestehende Herzwurminfektion untersucht werden, bevor eine Behandlung mit Evicto eingeleitet wird. Evicto besitzt keine Wirksamkeit gegen erwachsene Herzwürmer; es kann jedoch die Anzahl der im Blutkreislauf zirkulierenden Larven (Mikrofilarien) herabsetzen.

### ***Ohrmilbenbefall (Katzen, Hunde): Bekämpfung und Vorbeugung***

Auch zur Behandlung des Ohrmilbenbefalls muss das Tierarzneimittel zwischen den Schulterblättern verabreicht werden und darf nicht in den Gehörgang getropft werden.

Katzen: Eine einmalige Dosis von Evicto ist zu verabreichen.

Hunde: Evicto sollte einmalig verabreicht werden. Loses Ohrschmalz sollte vor jeder Behandlung vorsichtig aus dem äusseren Gehörgang entfernt werden. Es wird empfohlen nach 30 Tagen erneut eine klinische Untersuchung durchzuführen, da einige Tiere eine zweite Behandlung benötigen.

### ***Haarlingsbefall (Katzen, Hunde): Bekämpfung und Vorbeugung***

Zur Beseitigung des Befalls mit Haarlingen (*Trichodectes canis* und *Felicola subrostratus*) sollte Evicto einmal als Einzeldosis verabreicht werden. Eine monatliche Anwendung von Evicto beugt möglichen Infektionen mit Haarlingen vor.

### ***Sarcoptesräude (Hunde): Behandlung und Vorbeugung***

Zur vollständigen Beseitigung der Milben (*Sarcoptes scabiei*), sollte Evicto zweimal im monatlichen Abstand verabreicht werden. Eine monatliche Anwendung von Evicto beugt möglichen Infektionen mit Sarcoptesmilben vor.

### ***Fadenwürmerbefall (Hunde): Behandlung und Vorbeugung***

Evicto sollte für die Behandlung des Befalls mit Spulwürmern (*Toxocara canis*) einmal als Einzeldosis angewendet werden. Spulwurmbefall wird durch monatliche Anwendung von Evicto vorgebeugt.

### ***Fadenwürmerbefall (Katzen): Behandlung und Vorbeugung***


Evicto sollte für die Behandlung im Darm lebender Stadien von Hakenwürmern (*Ancylostoma tubaeforme*) und Spulwürmern (*Toxocara cati*) einmal als Einzeldosis angewendet werden. Haken- und Spulwurmbefall wird durch die monatliche Anwendung von Evicto vorgebeugt.

### **Flohbefall bei Welpen und Kätzchen während der Laktation: Vorbeugung**

Welpen und Kätzchen können vor einem Befall von Flöhen geschützt werden durch Behandlung des Muttertieres. Dieses soll zwei Wochen vor und 10 Tage nach der Geburt mit Evicto behandelt werden. Danach ist die Behandlung monatlich fortzuführen. Selamectin ist während der Trächtigkeit und Laktation gut verträglich. Es konnten keine nachteiligen Auswirkungen weder bei den Welpen bzw. Kätzchen noch bei deren Muttertieren festgestellt werden.

## **9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG**

Unmittelbar vor der Anwendung die Pipette aus dem schützenden Aluminium-Beutel nehmen.



- 1) Pipette aufrecht halten, Deckel entfernen.
  - 2) Deckel umdrehen und das andere Ende wieder auf die Applikatortspitze aufsetzen. Deckel herunterdrücken, um die Versiegelung des Applikators zu durchstechen. Deckel vor der Applikation entfernen.
  - 3) Die Haare am Halsansatz vor den Schulterblättern scheideln, bis eine kleine Hautfläche sichtbar wird. Die Pipettenspitze direkt auf die Haut aufsetzen, dann die Pipette mehrmals fest zusammendrücken, um den gesamten Inhalt an dieser Applikationsstelle zu entleeren.
- Nicht in die Auftragsstelle einmassieren. Darauf achten, dass Evicto nicht an die Finger gelangt.
  - Nicht anwenden, wenn das Fell des Tieres nass ist. Die Wirksamkeit von Evicto wird jedoch nicht eingeschränkt, wenn das Tier zwei oder mehr Stunden nach der Behandlung gebadet wird, dem Regen ausgesetzt ist oder im Wasser schwimmt.

## 10. WARTEZEIT(EN)

Nicht zutreffend.

## 11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

In der Originalverpackung aufbewahren und trocken lagern, um vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.

Für dieses Tierarzneimittel sind bezüglich Temperatur keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

## 12. BESONDERE WARNHINWEISE

### Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Nicht eingeben. Dieses Tierarzneimittel ist nur zum Auftragen auf die Hautoberfläche bestimmt.

Direkten Kontakt mit dem behandelten Tier vermeiden, bis die Auftragestelle getrocknet ist. In dieser Zeit soll der Hund auch nicht baden oder schwimmen.

In seltenen Fällen kann die Anwendung des Tierarzneimittels eine zeitweilige lokale Verklebung der Haare an der Auftragestelle und/oder das Auftreten einer kleinen Menge einer weissen, pudrigen Substanz bewirken. Dies sind normale Reaktionen, die normalerweise innerhalb von 24 Stunden nach der Behandlung wieder verschwinden und weder die Sicherheit noch die Wirksamkeit des Tierarzneimittels beeinträchtigen.

### Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwenderin / den Anwender:

Während des Umgangs mit dem Tierarzneimittel nicht rauchen, essen oder trinken. Leicht entzündlich; von Hitze, Funken, offenen Flammen oder sonstigen Zündquellen fernhalten. Nach Gebrauch Hände waschen. Bei Hautkontakt das Tierarzneimittel sofort mit Seife und Wasser abwaschen. Bei versehentlichem Augenkontakt sofort die Augen mit reichlich Wasser ausspülen und den Arzt aufsuchen sowie diesem die Packungsbeilage oder das Etikett zeigen.

Der direkte Kontakt mit behandelten Tieren ist zu vermeiden, bis die behandelte Stelle getrocknet ist. Am Tag der Behandlung dürfen Kinder nicht mit behandelten Tieren umgehen und den Tieren sollte nicht gestattet werden, bei ihren Besitzern zu schlafen, insbesondere nicht bei Kindern.

Gebrauchte Applikatoren sofort ausserhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern entsorgen.

### Trächtigkeit und Laktation:

Das Tierarzneimittel kann bei Zuchttieren sowie bei trächtigen und säugenden Kätzinnen und Hündinnen angewendet werden.

### Überdosierung (Symptome, Notfallmassnahmen, Gegenmittel):

Nach Gabe der 10fachen empfohlenen Dosis des Wirkstoffes von Evicto wurden keine Nebenwirkungen beobachtet. Der Wirkstoff wurde bei Hunden und Katzen mit Infektionen mit adulten Herzwürmern bis zum 3fachen der empfohlenen Dosis verabreicht, ohne dass Nebenwirkungen auftraten. Der Wirkstoff wurde auch bis zum 3fachen der empfohlenen Dosis an weibliche und männliche Katzen und Hunde, die zur Zucht eingesetzt wurden sowie trächtigen und säugenden Kätzinnen und Hündinnen verabreicht, ohne dass Nebenwirkungen auftraten.

Die 5fache empfohlene Dosis des Wirkstoffes von Evicto führte zu keinen Nebenwirkungen bei Collies, welche überempfindlich auch den Wirkstoff Ivermectin reagieren.

### **13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Evicto darf nicht in Gewässer gelangen, da dies für Fische und andere Wasserorganismen gefährlich sein kann. Behandelte Tiere mindestens in den ersten zwei Stunden nach der Anwendung von Gewässern fernhalten. Leere Behältnisse und nicht verwendete Arzneimittel sollten zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden, um so eine Kontamination von Gewässern zu vermeiden. Es ist dabei sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff erfolgen kann.

### **14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE**

13.08.2024

Weitere Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie unter [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) und [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

### **15. WEITERE ANGABEN**

Evicto ist in Kunststoffpipetten (Einmaldosen) erhältlich.

#### Packungsgrössen (alle Pipettengrössen):

Faltschachteln mit 4 Pipetten

Faltschachteln mit 24 Pipetten

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrössen in Verkehr gebracht.

Abgabekategorie B: Abgabe auf tierärztliche Verschreibung

Swissmedic 67'234

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit der in der Rubrik 1 genannten Zulassungsinhaberin in Verbindung.