

INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site

www.tierarzneimittel.ch

NOTICE D'EMBALLAGE

Evicto® 15 mg Spot-on ad us. vet., Solution pour application cutanée pour chiens et chats jusqu'à 2,5 kg

Evicto® 30 mg Spot-on ad us. vet., Solution pour application cutanée pour chiens de 2,6 à 5,0 kg

Evicto® 45 mg Spot-on ad us. vet., Solution pour application cutanée pour chats de 2,6 à 7,5 kg

Evicto® 60 mg Spot-on ad us. vet., Solution pour application cutanée pour chats de 7,6 kg à 10,0 kg

Evicto® 60 mg Spot-on ad us. vet., Solution pour application cutanée pour chiens de 5,1 kg à 10,0 kg

Evicto® 120 mg Spot-on ad us. vet., Solution pour application cutanée pour chiens de 10,1 kg à 20,0 kg

Evicto® 240 mg Spot-on ad us. vet., Solution pour application cutanée pour chiens de 20,1 kg à 40,0 kg

Evicto® 360 mg Spot-on ad us. vet., Solution pour application cutanée pour chiens de 40,1 kg à 60,0 kg

1 NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché: Virbac (Switzerland) AG, 8152 Opfikon. Domicile: Postfach 353, 8152 Glattbrugg

Fabricant responsable de la libération des lots: Virbac, 1^{ère} avenue, 2065m – LID, 06510 Carros, France

2 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Evicto Spot-on ad us. vet., solution pour application cutanée pour chiens et chats

3 LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

1 pipette contient: **Substance active:**

	Sélamectine (mg)	Contenu de la pipette (ml)
Evicto 15 mg pour chiens et chats ¹	15	0,25
Evicto 30 mg pour chiens ²	30	0,25
Evicto 45 mg pour chats ¹	45	0,75
Evicto 60 mg pour chats ¹	60	1
Evicto 60 mg pour chiens ²	60	0,5
Evicto 120 mg pour chiens ²	120	1
Evicto 240 mg pour chiens ²	240	2
Evicto 360 mg pour chiens ²	360	3

¹ Concentration de la solution dans l'alcool isopropylique: 6 %.

² Concentration de la solution dans l'alcool isopropylique: 12 %.

Excipient:

Butylhydroxytoluène 0,8 mg/ml

Solution pour application cutanée.

Solution claire, incolore à jaune.

4 INDICATION(S)

Chiens et chats:

- Traitement et prévention des infestations par les puces pendant un mois après l'administration d'une dose unique. Ceci est le résultat de l'activité adulticide, larvicide et ovicide du médicament vétérinaire. Après administration, le médicament vétérinaire a un effet ovicide sur une période de 3 semaines. En réduisant la population de puces, un traitement mensuel des animaux en gestation et en lactation contribue également à la prévention des infestations de la portée par les puces. Le médicament vétérinaire peut être utilisé dans le cadre de la stratégie de traitement de la dermatite allergique aux piqûres des puces et, grâce à son activité ovicide et larvicide, il peut contribuer à contrôler l'infestation par les puces dans l'environnement de l'animal.
- Prévention de la dirofilariose, due à *Dirofilaria immitis*, par un traitement mensuel,
- Traitement et prévention de la gale des oreilles (*Otodectes cynotis*).

Chats:

- Traitement et prévention des stades intestinaux des ascaris (*Toxocara cati*) et des ankylostomes (*Ancylostoma tubaeforme*).
- Traitement et prévention des infestations par les poux broyeurs (*Felicola subrostratus*).

Chiens:

- Traitement et prévention de l'infestation par les poux broyeurs (*Trichodectes canis*).
- Traitement et prévention de la gale sarcoptique (due à *Sarcoptes scabiei*).
- Lutte et contrôle des ascaris (*Toxocara canis*).

5 CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser chez les animaux de moins de 6 semaines. Ceux-ci doivent être protégés en traitant la mère.

Ne pas utiliser chez les chats atteints de maladies concomitantes ou affaiblis et d'un poids insuffisant (pour leur taille et leur âge).

6 EFFETS INDÉSIRABLES

L'utilisation du médicament vétérinaire chez les chats s'accompagne dans des cas isolés d'une légère alopecie passagère au site d'application. Dans de très rares cas, une irritation locale et transitoire a pu être observée. L'alopecie et l'irritation disparaissent généralement sans traitement.

Très rarement, comme avec d'autres antiparasitaires de la même classe de substances actives, des signes neurologiques réversibles, y compris des convulsions, ont été observés chez les chiens et les chats après l'application du médicament vétérinaire.

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit:

- très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 animaux traités)
- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités)
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1000 animaux traités)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités)
- très rare (moins d'un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés)

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

7 ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chiens et chats

8 POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Evicto doit être administré en application cutanée unique. Les tableaux suivants définissent la taille des pipettes à utiliser en fonction du poids corporel (correspondant à au moins 6 mg de sélamectine/kg de poids corporel):

Chats (kg de poids corporel)	Quantité de sélamectine	Désignation de la taille de pipette à utiliser
jusqu'à 2,5	15 mg	Evicto 15 mg pour chiens et chats jusqu'à 2,5 kg
2,6 - 7,5	45 mg	Evicto 45 mg pour chats de 2.6 à 7.5 kg
7,6 - 10,0	60 mg	Evicto 60 mg pour chats de 7,6 à 10,0 kg
plus de 10	Combinaison correspondante de pipettes	

Chiens (kg de poids corporel)	Quantité de sélamectine	Désignation de la taille de pipette à utiliser
jusqu'à 2,5	15 mg	Evicto 15 mg pour chiens et chats jusqu'à 2,5 kg
2,6 - 5,0	30 mg	Evicto 30 mg pour chiens de 2,6 à 5,0 kg
5,1 - 10,0	60 mg	Evicto 60 mg pour chiens de 5,1 à 10,0 kg
10,1 - 20,0	120 mg	Evicto 120 mg pour chiens de 10,1 à 20,0 kg
20,1 - 40,0	240 mg	Evicto 240 mg pour chiens de 20,1 à 40,0 kg
40,1 - 60,0	360 mg	Evicto 360 mg pour chiens de 40,1 à 60,0 kg
plus de 60	Combinaison correspondante de pipettes	

Infestation par les puces (chats, chiens): lutte et prévention

Après administration d'Evicto les puces adultes présentes sur l'animal sont tuées, des œufs viables ne sont plus produits et les larves (présentes seulement dans l'environnement) sont tuées. La reproduction des puces est ainsi stoppée, le cycle de vie des puces est interrompu, contribuant ainsi à contrôler les infestations existantes de puces dans l'environnement de l'animal.

Pour la prévention des infestations par les puces, le médicament vétérinaire doit être administré à intervalles mensuels pendant la saison des puces, en commençant un mois avant que les puces ne deviennent actives. En réduisant la population de puces, le traitement mensuel de la femelle gestante ou allaitante aide à prévenir les infestations par des puces de la portée jusqu'à l'âge de 7 semaines.

Dermatite allergique aux piqûres de puces (chats, chiens): traitement et contrôle

Evicto est indiqué pour le traitement et le contrôle de la dermatite allergique induite par les puces chez les chiens et les chats. Intégré dans un programme thérapeutique contre la dermatite allergique aux piqûres de puces, le médicament vétérinaire doit être administré mensuellement. Chez les animaux présentant un sévère prurit, un traitement symptomatique simultané est nécessaire.

Dirofilariose (chats, chiens): prévention

Pour prévenir la dirofilariose, Evicto doit être administré tous les mois dans les pays où le vecteur existe. Evicto peut être administré toute l'année ou, au minimum, dans le mois suivant la première exposition de l'animal aux moustiques. Le traitement mensuel se poursuit ensuite jusqu'à la fin de la saison des moustiques. La dernière dose doit avoir lieu dans le mois suivant la dernière exposition aux moustiques. En cas d'oubli d'un des traitements mensuels, et si l'intervalle d'un mois entre deux applications se trouve alors dépassé, l'administration immédiate d'Evicto et le retour à un rythme mensuel d'administration minimiseront les risques de développement de formes adultes de vers de cœur.

Lorsque, dans le cadre d'un programme de prévention de la dirofilariose, un autre médicament vétérinaire est remplacé par Evicto, la première dose d'Evicto doit être administrée dans le mois suivant la dernière application du médicament vétérinaire utilisé précédemment. Evicto est bien toléré chez les animaux atteints d'une dirofilariose. Toutefois, dans les zones endémiques, il est recommandé que tous les animaux âgés de 6 mois ou plus soient soumis à un test de dépistage de l'infection par les vers du cœur avant le début d'un traitement avec Evicto. Evicto n'est pas efficace contre les vers du cœur adultes, mais il peut réduire le nombre de larves circulant dans le sang (microfilaires).

Gale des oreilles (chats, chiens): lutte et prévention

Pour le traitement de la gale des oreilles, le médicament vétérinaire doit également être administré entre les omoplates et ne doit pas être déposé en gouttes dans le conduit auditif.

Chats: appliquer une dose unique d'Evicto.

Chiens: Evicto doit être administré une seule fois. Il est recommandé de retirer doucement le cérumen libre du conduit auditif externe avant chaque administration. Un examen clinique supplémentaire après 30 jours est conseillé, car certains animaux ont besoin d'un deuxième traitement.

Infestation par des poux broyeurs (chats, chiens): lutte et prévention

Pour éliminer l'infestation par des poux broyeurs (*Trichodectes canis* et *Felicola subrostratus*), Evicto doit être appliqué une fois en dose unique. Une administration mensuelle d'Evicto préviendra d'éventuelles infections par des poux broyeurs.

Gale sarcoptique (chiens): traitement et prévention

Pour l'élimination complète des acariens (*Sarcoptes scabiei*), Evicto doit être administré deux fois, à 1 mois d'intervalle. L'application mensuelle d'Evicto préviendra d'éventuelles infections par les acariens Sarcoptes.

Infestation par des nématodes (chiens): traitement et prévention

Pour le traitement des infestations par les ascaris (*Toxocara canis*), Evicto doit être utilisé une fois en dose unique. L'infestation par les ascaris est prévenue par une application mensuelle d'Evicto.

Infestation par des nématodes (chats): traitement et prévention


Pour le traitement des stades intestinaux des ankylostomes (*Ancylostoma tubaeforme*) et des ascaris (*Toxocara cati*), Evicto doit être appliqué une fois en dose unique. Une administration mensuelle d'Evicto préviendra des infestations par des ankylostomes et des ascaris.

Infestation par les puces chez les chiots et les chatons pendant la lactation: prévention

En traitant leur mère les chiots et les chatons peuvent être protégés contre une infestation de puces. Celle-ci doit être traitée avec Evicto deux semaines avant et 10 jours après la mise-bas. Le traitement doit ensuite être poursuivi tous les mois. La sélamectine est bien tolérée pendant la gestation et la lactation. Aucun effet indésirable n'a été observé, ni chez les chiots ou les chatons, ni chez leur mère.

9 CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Retirer la pipette de son sachet de protection en aluminium juste avant l'application.



- 1) Tenir la pipette en position verticale, enlever le capuchon.
 - 2) Retourner le capuchon et placer l'autre extrémité sur l'embout de l'applicateur. Pousser le capuchon vers le bas pour perforer l'opercule de protection de l'applicateur. Retirer le capuchon avant l'application.
 - 3) Ecarter les poils à la base du cou, en avant les omoplates, afin de libérer une petite zone de peau nue. Placer le bout de la pipette directement sur la peau. Presser alors fermement la pipette plusieurs fois pour la vider totalement de son contenu, en un seul point d'application.
- Ne pas effectuer de massage au site d'application. Eviter le contact entre Evicto et les doigts.
 - Ne pas appliquer si le poil de l'animal est mouillé. Cependant un shampoing ou une baignade de l'animal ou la pluie 2 heures ou plus après le traitement ne réduira pas l'efficacité d'Evicto.

10 TEMPS D'ATTENTE

Sans objet

11 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Conserver dans l'emballage d'origine dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Pas de précautions particulières de conservation concernant la température.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

12 MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal:

Ne pas administrer par voie orale. Ce médicament vétérinaire est uniquement destiné à être appliqué à la surface de la peau. Éviter tout contact direct avec l'animal traité jusqu'à ce que le site d'application ait séché. Pendant cette période, le chien ne doit pas non plus se baigner ou nager.

Dans de rares cas, l'application du médicament vétérinaire peut provoquer un collage local temporaire des poils au site d'application et/ou l'apparition d'une petite quantité de substance blanche et poudreuse. Il s'agit de réactions normales qui disparaissent normalement dans les 24 heures suivant le traitement et qui n'affectent ni la sécurité ni l'efficacité du médicament vétérinaire.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux:

Ne pas fumer, manger ou boire pendant la manipulation du médicament vétérinaire. Facilement inflammable; tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues ou de toute autre source d'inflammation. Se laver les mains après utilisation. En cas de contact du médicament vétérinaire avec la peau, laver immédiatement avec du savon et de l'eau. En cas de contact oculaire accidentel, rincer immédiatement et abondamment les yeux à l'eau et consulter un médecin en lui montrant la notice ou l'étiquette.

Éviter tout contact direct avec les animaux traités jusqu'à ce que la zone traitée soit sèche.

Le jour du traitement, les enfants ne doivent pas avoir du contact avec les animaux traités et les animaux ne doivent pas être autorisés à dormir avec leurs propriétaires, en particulier les enfants.

Jeter immédiatement les applicateurs usagés hors de la vue et de la portée des enfants.

Gestation et lactation:

Le médicament vétérinaire peut être utilisé chez les animaux d'élevage ainsi que chez les chattes et les chiennes en gestation ou en lactation.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes):

Aucun effet indésirable n'a été observé après l'administration de 10 fois la dose recommandée de la substance active d'Evicto. La substance active a été administrée jusqu'à 3 fois la dose recommandée chez des chiens et des chats infectés par des vers du cœur adultes, sans que des effets indésirables n'aient été observés. La substance active a également été administrée jusqu'à 3 fois la dose recommandée à des chats et des chiens femelles et mâles utilisés à des fins de reproduction ainsi qu'à des chattes et des chiennes en gestation ou en lactation. Jusqu'à 5 fois la dose recommandée n'a mené à aucun effet indésirable chez des colleys sensibles à la substance active ivermectine.

13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Evicto ne doit pas être déversé dans les cours d'eau, car cela pourrait mettre en danger les poissons et autres organismes aquatiques. Tenir les animaux traités à l'écart des cours d'eau pendant au moins les deux premières heures suivant l'application. Les récipients vides et les médicaments non utilisés doivent être éliminés avec les déchets ménagers afin d'éviter toute contamination des cours d'eau. Éviter tout accès abusif.

14 DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

13.08.2024

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament vétérinaire aux adresses www.swissmedic.ch et www.tierarzneimittel.ch.

15 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Evicto est disponible en pipettes en plastique (unidoses).

Tailles d'emballage (toutes les tailles de pipettes):

Boîtes pliantes de 4 pipettes

Boîtes pliantes de 24 pipettes

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire

Swissmedic 67'234

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché désigné à la rubrique 1.