

VIGOPHOS® 10% ad us. vet.

Injektionslösung

10%ige Injektionslösung einer organischen Phosphorverbindung mit Zusatz von Vitamin B₁₂ zur Anregung des Stoffwechsels
Butafosfanum, Cyanocobalaminum

de Zusammensetzung

1 ml Injektionslösung enthält:

Butafosfanum	100 mg
Cyanocobalaminum (Vitaminum B ₁₂)	50 µg
Conserv.: Alcohol benzylicus	10 mg
Aqua ad iniectionabilia	ad 1 ml

Eigenschaften/Wirkungen

Vigophos enthält eine organische Phosphorverbindung ohne ein Nahrungsmittel zu sein. Diese kann einen positiven Einfluss auf Assimilationsprozesse im Körper haben und wird daher auch als Assimilator bezeichnet. Ausserdem wird Phosphor (100 ml enthalten 1,73 g Phosphor) in dieser Form schon bald nach Entfaltung seiner stimulierenden Wirkung auf die Stoffwechselfvorgänge wieder ausgeschieden.

Aufgrund seines Vitamin-B₁₂-Gehalts fördert Vigophos den Eiweiss-, Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel.

Indikationen

- Entwicklungs- und Ernährungsstörungen der Jungtiere infolge von Aufzuchtkrankheiten
- Prophylaxe der Sterilität und puerperaler Erkrankungen und zur Unterstützung der Sterilitätsbehandlung
- Tetanien und Paresen zusätzlich zur Ca-, Mg-Therapie
- Als Tonikum bei Überanstrengung und Erschöpfung

Dosierung/Anwendung

Intravenös, intramuskulär oder subkutan

In akuten Fällen erhalten:

Pferd, Rind:	5 - 25 ml
Fohlen, Kalb:	5 - 12 ml
Schaf, Ziege:	2,5 - 5 ml
Lamm:	1,5 - 2,5 ml
Schwein:	2,5 - 10 ml
Saugferkel:	1 - 2,5 ml
Hund, Katze, Pelztiere:	0,5 - 5 ml
Geflügel:	1 ml

Wiederholung bei Bedarf täglich

Bei chronischen Erkrankungen halbe Dosis mehrmals in Abständen von 3 bis 5 Tagen

Anwendungseinschränkungen

Kontraindikationen

Keine bekannt

Vorsichtsmassnahmen

Keine notwendig

Unerwünschte Wirkungen

Keine bekannt

Wartezeiten

Keine

Wechselwirkungen

Keine bekannt

Sonstige Hinweise

Bei Raumtemperatur (15 – 25 °C) und vor Licht geschützt lagern.

Aufbrauchfrist nach erster Entnahme: 28 Tage

Das Präparat darf nur bis zu dem auf der Packung mit «EXP.» bezeichneten Datum verwendet werden.

Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile sollten den Kontakt mit dem Tierarzneimittel vermeiden.

Das Tierarzneimittel kann an Haut und Augen leichte Reizungen hervorrufen. Aus diesem Grund sollte eine Exposition der Haut und Augen vermieden werden. Bei Kontakt sind Haut und/oder Augen gründlich mit Wasser zu spülen.

Swissmedic Nr. 67'309

Abgabekategorie: B

ATCvet Code: QA12CX91

Packungen

1 x 100 ml Durchstechflaschen

Zulassungsinhaber

Dr. E. Graeub AG, Bern

Stand der Information: 30.07.2019