

VIGOPHOS[®] 10% ad us. vet.

Solution injectable

Solution à 10% injectable d'un composé organique phosphoré avec un complément de vitamine B₁₂ pour la stimulation du métabolisme Butafosfanum, Cyanocobalaminum

fr Composition

1 ml de solution injectable contient :

Butafosfanum	100 mg
Cyanocobalaminum (Vitaminum B ₁₂)	50 µg
Conserv.: Alcohol benzylicus	10 mg
Aqua ad iniectionabilia	ad 1 ml

Propriétés/Effets

Vigophos contient un composé organique phosphoré sans être un produit alimentaire. Celui-ci peut avoir une influence positive sur le processus d'assimilation dans le corps et est, par conséquent, aussi qualifié d'assimilateur. De plus, le phosphore sous cette forme (100 ml contiennent 1.73 g de phosphore) est rapidement éliminé après le déploiement de son action stimulante sur les différents processus du métabolisme.

En raison de sa teneur en vitamine B₁₂, Vigophos favorise le métabolisme des protéines, des hydrates de carbone et des graisses.

Indications

- Troubles de la croissance et de l'alimentation chez les jeunes animaux des suites de maladies liées à l'élevage
- Prophylaxie de la stérilité et des maladies puerpérales et soutien du traitement de la stérilité
- Tétanies et parésies, en addition au traitement avec calcium et magnésium
- Comme tonique lors d'efforts excessifs ou d'épuisement

Posologie/Mode d'emploi

Administration intraveineuse, intramusculaire ou sous-cutanée

Administrer dans les cas aigus :

Cheval, bovin :	5 - 25 ml
Poulain, veau :	5 - 12 ml
Ovin, caprin :	2.5 - 5 ml
Agneau :	1.5 - 2.5 ml
Porcin :	2.5 - 10 ml
Porcelet non sevré :	1 - 2.5 ml
Chien, chat, animaux à fourrure :	0.5 - 5 ml
Volaille :	1 ml

Répétition quotidienne en cas de besoin

En cas de maladie chronique, administrer répétitivement la moitié de la dose avec un intervalle de 3 à 5 jours entre les administrations.

Limitations d'emploi

Contre-indications

Aucune connue

Précautions d'emploi

Aucune nécessaire

Effets indésirables

Aucun connu

Délais d'attente

Aucun

Interactions

Aucune connue

Remarques particulières

Conservé à température ambiante (15 – 25 °C) et à l'abri de la lumière.

Conservation du flacon une fois entamé : 28 jours

Le produit ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant avec la mention «EXP.» sur l'emballage.

Tenir hors de portée des enfants.

Les personnes avec une hypersensibilité connue à l'un des composants doivent éviter le contact avec le médicament vétérinaire.

Le médicament vétérinaire peut générer de légères irritations de la peau et des yeux. Pour cette raison, une exposition de la peau et des yeux doit être évitée. En cas de contact avec la peau et/ou les yeux, rincer abondamment avec de l'eau.

Swissmedic Nr 67'309

Catégorie de remise : B

ATCvet Code : QA12CX91

Présentations

1 x 100 ml flacons pour prélèvements multiples

Titulaire de l'autorisation

Dr. E. Graeub AG, Berne

Mise à jour de l'information : 30.07.2019