

# METROVIS 250 mg ad us. vet.

Compresse per cani e gatti

Metronidazolo

## Foglio illustrativo

### 1. Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi

Titolare dell'autorizzazione:

Dr. E. Graeb AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Berna

### Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

aniMedica GmbH, Im Südfeld 9, 48308 Senden-Bösensell, Germania

0

aniMedica Herstellungs GmbH, Im Südfeld 9, 48308 Senden-Bösensell, Germania

0

Industrial Veterinaria S.A., Esmeralda 19, Esplugues de Llobregat, 08950 Barcelona, Spagna

### 2. Denominazione del medicinale veterinario

Metrovis 250 mg ad us. vet., compresse per cani e gatti

Metronidazolo

### 3. Indicazione del principio attivo e degli altri ingredienti

1 compressa contiene:

Principio attivo: Metronidazolo 250 mg

Compresse di colore beige, rotonde, con una linea di incisione a forma di croce su un lato

Le compresse possono essere divise in 2 o in 4 parti uguali.

### 4. Indicazioni

Antinfettivo, antiprotozoario per cani e gatti

Trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale dovute a *Giardia* spp. e *Clostridium* spp. (cioè *C. perfringens* o *C. difficile*).

Trattamento delle infezioni del tratto urogenitale, della cavità orale, della gola e della pelle dovute a batteri anaerobi obbligati (ad es. *Clostridium* spp.) sensibili al metronidazolo.

### 5. Controindicazioni

Non usare in caso di malattie epatiche. Non usare in casi di nota ipersensibilità al principio attivo o altro eccipiente.

### 6. Reazioni avverse

Dopo la somministrazione di metronidazolo possono verificarsi le seguenti reazioni avverse: vomito, epatotossicità, neutropenia e segni neurologici.

Se dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglio illustrativo o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne il medico veterinario.

### 7. Specie di destinazione

Cane e gatto

### 8. Posologia per ciascuna specie, via e modalità di somministrazione

Per somministrazione orale

La dose raccomandata è di 50 mg di metronidazolo per kg di peso corporeo al giorno, per 5-7 giorni. La dose giornaliera può essere suddivisa in due dosi uguali (cioè 25 mg/kg di peso corporeo due volte al giorno).

Per garantire la somministrazione della dose corretta, il peso corporeo deve essere determinato nel modo più accurato possibile. La tabella seguente è intesa come guida alla somministrazione del prodotto alla dose raccomandata di 50 mg per kg di peso corporeo al giorno, somministrata una volta al giorno o, preferibilmente, due volte al giorno in dosi da 25 mg per kg di peso corporeo.

| Peso corporeo (kg) | Numero di compresse |      | Una volta al giorno |
|--------------------|---------------------|------|---------------------|
|                    | Mattina             | Sera |                     |
| 5 kg               | ½                   | ½    | 1                   |
| 7,5 kg             | ¾                   | ¾    | 1 ½                 |
| 10 kg              | 1                   | 1    | 2                   |
| 12,5 kg            | 1 ¼                 | 1 ¼  | 2 ½                 |
| 15 kg              | 1 ½                 | 1 ½  | 3                   |
| 17,5 kg            | 1 ¾                 | 1 ¾  | 3 ½                 |
| 20 kg              | 2                   | 2    | 4                   |



¼ di compressa



½ di compressa



¾ di compressa



1 compressa

### 9. Avvertenze per una corretta somministrazione

Le compresse possono essere divise in 2 o in 4 parti uguali per un dosaggio preciso. Appoggiare le compresse su una superficie piana, con il lato che reca la linea d'incisione rivolto verso l'alto e il lato convesso (rotondo) rivolto verso il piano d'appoggio.

Per rompere a metà: premere con i pollici sui due lati della compressa.

Per rompere in quattro: premere con il pollice al centro della compressa.

### 10. Tempi di attesa

Non pertinente

### 11. Particolari precauzioni per la conservazione


Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale veterinario non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza indicata con EXP.

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

Periodo di validità delle compresse divise: 3 giorni



### 12. Avvertenze speciali

**Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:** A causa della probabile variabilità (temporale, geografica) della presenza di batteri resistenti al metronidazolo, si raccomandano la raccolta di campioni batteriologici e l'analisi della sensibilità.

Quando possibile, il prodotto deve essere usato solo in base ai test di sensibilità.

Prendere in considerazione le politiche antimicrobiche ufficiali, nazionali e regionali quando si usa il medicinale veterinario.

In casi molto rari possono manifestarsi segni neurologici, in particolare dopo un trattamento prolungato con metronidazolo.

**Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:** Il metronidazolo ha proprietà mutagene e genotossiche dimostrate negli animali da laboratorio e nell'uomo. È dimostrato che il metronidazolo è cancerogeno negli animali da laboratorio, e nell'uomo sono possibili effetti carcinogeni. Il rischio corrispondente non è stato chiarito in modo definitivo.

Il metronidazolo può essere nocivo per il feto.

Indossare guanti impermeabili durante la somministrazione del prodotto per evitare il contatto con la pelle.

Per evitare l'ingestione accidentale, soprattutto da parte dei bambini, le parti non utilizzate delle compresse devono essere riposte nel blister aperto, richiuse nell'imballaggio esterno e conservate in un luogo sicuro fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente a un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta. Lavarsi le mani con cura dopo aver maneggiato le compresse. Il metronidazolo può causare reazioni di ipersensibilità. Le persone con nota ipersensibilità al metronidazolo devono evitare contatti con il medicinale veterinario. Importante: il contatto della pelle con le compresse deve essere evitato il più possibile.

**Gravidanza:** Gli studi negli animali da laboratorio hanno evidenziato risultati non coerenti per quanto riguarda gli effetti teratogeni/embriotossici del metronidazolo. L'uso non è raccomandato durante la gravidanza.

**Allattamento:** Il metronidazolo è escreto nel latte e quindi l'uso non è raccomandato durante l'allattamento.

**Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione:** Il metronidazolo può avere un effetto inibitorio sulla degradazione di altri farmaci nel fegato, come fenitoina, ciclosporina e warfarin.

La cimetidina può ridurre il metabolismo epatico del metronidazolo e quindi aumentarne la concentrazione nel siero.

Il fenobarbital può potenziare il metabolismo epatico del metronidazolo e quindi ridurne la concentrazione nel siero.

**Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):** Gli eventi avversi sono più probabili in caso di dosi e durata del trattamento superiori rispetto al regime terapeutico raccomandato. Se si manifestano segni neurologici, il trattamento deve essere interrotto e l'animale deve essere sottoposto a trattamento sintomatico.

### 13. Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del prodotto non utilizzato o degli eventuali rifiuti

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

### 14. Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo

13.08.2019

Ulteriori informazioni su questo medicinale veterinario si trovano sul [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) e [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

### 15. Altre informazioni

Scatola di cartone da 1, 5 o 10 blister da 10 compresse

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria

Swissmedic 67'635

Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, si prega di contattare il rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.