

## INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site

[www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

### NOTICE D'EMBALLAGE

Combotec Spot-On Chat et Furet ad us. vet., Solution pour spot-on

#### 1 NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché : Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier, Suisse

Fabricant responsable de la libération des lots : Beaphar B.V., Oude Linderteseweg 9, 8102 EV Raalte, Pays-Bas

#### 2 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Combotec Spot-On Chat et Furet ad us. vet., Solution pour spot-on



#### 3 LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

1 pipette de 0.5 ml contient :

##### Substances actives :

Fipronil	50 mg
(S)-méthoprène	60 mg

##### Excipients :

Butylhydroxyanisol (E320)	0.10 mg
Butylhydroxytoluène (E321)	0.05 mg

Combotec Spot-on chat et furet est une solution claire, de couleur ambre à appliquer sur la peau.

#### 4 INDICATION(S)

**Pour chats (âge minimum 8 semaines ou pesant plus de 1 kg) :**

- A utiliser contre les infestations par les puces seules ou les infestations mixtes par les puces et tiques et/ou les poux broyeurs.

- Elimination des puces. L'efficacité insecticide contre les infestations par les puces adultes persiste pendant 4 semaines. Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des œufs et des larves et nymphes issues des œufs pondus par les puces adultes pendant 6 semaines après application.
- Elimination des tiques. Le produit a une efficacité contre les nouvelles infestations par les tiques qui persiste selon les données expérimentales jusqu'à 2 semaines.
- Elimination des poux broyeur.
- Le médicament peut être intégré dans un programme de traitement de la Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces.

### **Pour furets (âge minimum 6 mois) :**

- A utiliser contre les infestations par des puces seules ou des infestations mixtes par des puces et des tiques.
- Elimination des puces. L'efficacité insecticide contre les infestations par les puces adultes persiste pendant 4 semaines. Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des œufs et des larves et nymphes issues des œufs pondus par les puces adultes.
- Elimination des tiques. Le produit a une efficacité contre les tiques qui persiste pendant 4 semaines.

## **5 CONTRE-INDICATIONS**

- En l'absence de données disponibles, ne pas traiter les chatons âgés de moins de 8 semaines ou pesant moins de 1 kg. Ne pas traiter les furets de moins de 6 mois. La toxicité potentielle du produit chez les chatons de moins de 8 semaines en contact avec une chatte traitée n'a pas été documentée. Des précautions spécifiques devront être prises dans ce cas.
- Ne pas utiliser sur des animaux malades (maladies touchant tout le corps, fièvre, etc.) ou convalescents.
- Ne pas utiliser chez les lapins, car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu.
- En l'absence d'études, l'utilisation de ce médicament vétérinaire n'est pas recommandée chez les espèces autres que les chats et les furets.
- Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à un principe actif ou à un autre composant.

## **6 EFFETS INDÉSIRABLES**

Ne pas surdoser.

En cas de léchage, une brève période d'hypersalivation, principalement due à la nature des excipients, peut se produire.

Parmi les effets secondaires très rarement suspectés, des réactions cutanées transitoires au niveau du site d'application (desquamation, chute locale des poils, démangeaisons, rougeurs) ainsi que des

démangeaisons généralisées ou une chute des poils ont été rapportés. Dans des cas exceptionnels, on a également observé de l'hypersalivation, des symptômes neurologiques (hypersensibilité, dépression, symptômes nerveux) ou des vomissements.

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit :

- très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 animaux traités)
- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités)
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1000 animaux traités)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités)
- très rare (moins d'un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés)

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

### 7 ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chats et furets.



### 8 POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Application topique cutanée.

#### **Chat :**


Administrer 1 pipette de 0.5 ml pour un chat. L'intervalle minimum entre deux traitements ne doit pas être inférieur à 4 semaines, car la tolérance à des intervalles de traitement plus courts n'a pas été testée.

#### **Furet :**

Administrer 1 pipette de 0.5 ml pour un furet. L'intervalle minimum de traitement est de 4 semaines.

Mode d'utilisation :

Utilisez les coins de la languette de décollement pour retirer une pipette de son blister. Ne percez pas le film avec des ciseaux, des couteaux ou d'autres instruments tranchants, car cela pourrait endommager la pipette à l'intérieur.



Tenir la pipette droite. Tapoter légèrement pour s'assurer que le contenu reste dans la partie large de la pipette. Casser la pointe de la pipette à l'endroit prévu à cet effet. Ecarter les poils au niveau du dos de l'animal, à la base de la nuque entre les omoplates, jusqu'à ce que la peau soit visible. Placer

l'embout de la pipette sur la peau et presser la pipette plusieurs fois afin de vider totalement son contenu sur la peau en un point.



### **9 CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE**

Il faut faire attention à ne pas trop mouiller les poils, car cela entraîne un aspect collant temporaire des poils à l'endroit du traitement. Si ce changement se produit, il disparaîtra dans les 24 heures suivant le traitement.

### **10 TEMPS D'ATTENTE**

Non applicable

### **11 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Conserver les pipettes dans le blister dans l'emballage extérieur de façon à protéger de la lumière.

### **12 MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)**

Précautions particulières pour chaque espèce cible :

Les autres animaux vivant sous le même toit doivent également être traités avec un produit approprié.

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal :

- Il est important de veiller à appliquer le produit sur une zone où l'animal ne peut pas se lécher et de veiller à ce que les animaux ne se lèchent pas entre eux.
- Ne pas mettre en contact avec les yeux et la gueule de l'animal.
- Des données évaluant l'effet d'un bain ou d'un shampoing sur l'efficacité du produit chez le chat ne sont pas disponibles. Cependant, sur la base des informations disponibles chez les chiens shampooinés à partir de deux jours suivant l'application du produit, il n'est pas recommandé de baigner les animaux dans les deux jours qui suivent l'application du produit.
- Des tiques attachées peuvent occasionnellement être observées aussi chez les animaux traités. Pour cette raison, la transmission des maladies infectieuses ne peut pas être complètement exclue si les conditions sont défavorables.
- Les puces des animaux de compagnie infestent souvent leur panier, leur zone de couchage et leurs zones régulières de repos comme les tapis et les canapés. En cas d'infestation massive et en début de traitement, ces endroits devront être traités avec un insecticide adapté et aspirés régulièrement.

## Notice d'emballage des médicaments à usage vétérinaire

---

- La toxicité potentielle du produit chez les chatons de moins de 8 semaines en contact avec une chatte traitée n'a pas été documentée. Des précautions spécifiques devront être prises dans ce cas.

### Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux :

Ce produit peut provoquer une irritation des muqueuses et des yeux. Donc éviter le contact du produit avec la bouche et les yeux.

Les personnes ayant une hypersensibilité connue aux produits contre les insectes (insecticides) ou à l'alcool devraient éviter le contact avec le médicament.

Éviter le contact du contenu avec les doigts. Si cela se produit, se laver les mains avec de l'eau et du savon.

En cas d'exposition accidentelle avec les yeux, rincer à l'eau pure avec soin.

Laver les mains après utilisation.

Ne pas manipuler les animaux traités et ne pas autoriser les enfants à jouer avec les animaux traités jusqu'à ce que le site d'application soit sec. Il est donc recommandé que les animaux ne soient pas traités dans la journée mais plutôt en début de soirée, et que les animaux récemment traités ne soient pas autorisés à dormir avec les propriétaires, surtout les enfants.

Ne pas fumer, boire ou manger pendant l'application.

### Autres précautions

Le produit peut avoir des effets néfastes sur les surfaces peintes, vernies ou autres surfaces domestiques ou objets d'ameublement.

### Gestation et lactation :

#### **Chat :**

Les études de laboratoire n'ont pas révélé de malformations ou d'effets nocifs pour le fœtus ou la mère. Il n'y a pas de restriction pour le traitement des chattes en gestation. Pour le traitement pendant la lactation, voir paragraphe 5.

#### **Furet :**

L'innocuité de ce médicament vétérinaire n'a pas été testée durant la gestation et la lactation chez le furet. Chez le furet, n'utiliser qu'après évaluation du rapport bénéfice/risque par le vétérinaire traitant.

### Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes) :

En cas de surdosage, Le risque de provoquer des effets secondaires peut augmenter (voir paragraphe 6).

#### **Chez les chats :**

Aucun effet indésirable n'a été mis en évidence dans des études de tolérances chez les chats et chatons de plus de 8 semaines ou ayant un poids d'environ 1 kg traités tous les mois pendant 6 mois à 5 fois la dose recommandée

Des démangeaisons peuvent apparaître suite au traitement.

Un surdosage du produit peut provoquer une apparence collante du poil au site d'application. Cependant, dans ce cas, les signes disparaîtront dans les 24 heures suivant l'application.

### **Chez les furets :**

Chez les furets de 6 mois et plus et traités toutes les 2 semaines pendant 2 mois à 5 fois la dose recommandée, une perte de poids a été observée chez quelques animaux. Dans l'étude d'innocuité, l'apparition de diarrhées était relativement fréquente.

### **13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT**

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

### **14 DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE**

29.08.2022

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament vétérinaire aux adresses [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) et [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

### **15 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**

Boîte de 3 ou 6 pipettes.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire

Swissmedic 68918

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.