PACKUNGSBEILAGE

ColicoSan ad us. vet., Lösung zum Eingeben

ColicoSan ad us. vet. wurde ausschliesslich aufgrund seiner langjährigen Verwendung zugelassen. Die Wirksamkeit und Sicherheit wurde mit Ausnahme der Lebensmittelsicherheit (Wartezeit) von Swissmedic nicht geprüft.

1. NAME UND ANSCHRIFT DER ZULASSUNGSINHABERIN

Zulassungsinhaberin: WALA Schweiz AG, Bärenplatz 2, 3011 Bern

Auslieferung: ufamed AG, 6210 Sursee

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

ColicoSan ad us. vet., Lösung zum Eingeben

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Wirkstoffe:
10 g (10,5 ml) Lösung enthalten
Sternanisöl 0,10 g
Bitterfenchelfruchtöl 0,10 g
Kümmelöl 0,10 g
Zimtöl, chinesisches 0,17 g
Schwefel 0,25 g

Sonstiger Bestandteil: Raffiniertes Leinöl

Dunkelbraune, dickflüssige Lösung mit charakteristischem Geruch nach Schwefel und ätherischen Ölen.

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Rinder, Pferde, Schweine, Schafe, Ziegen, Kaninchen, Hunde:
Traditionell angewendet als mild wirkendes Tierarzneimittel zur unterstützenden Behandlung bei futterbedingten Blähungen und Magen-Darm-Störungen.

5. GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder der sonstigen Bestandteile, insbesondere gegen Zimt- oder Fenchelöl.

6. NEBENWIRKUNGEN

In seltenen Fällen (mehr als 1 aber weniger als 10 von 10 000 behandelten Tieren) können bei entsprechender Disposition allergische Reaktionen gegen Zimt- oder Fenchelöl auftreten.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, beim behandelten Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrer Tierärztin / Ihrem Tierarzt oder Ihrer Apothekerin/ Ihrem Apotheker mit.

7. ZIELTIERART(EN)

Rinder, Pferde, Schweine, Schafe, Ziegen, Kaninchen, Hunde

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Zum Eingeben.
Dosierung: Bei Rindern, Pferden, Schweinen, Schafen, Ziegen, Hunden und Kaninchen wird in Abhängigkeit vom Körpergewicht folgendermassen dosiert:
Einzeldosis:

Gewichtsklasse	Dosis in ml/10 kg	Dosis in mg/kg	Beispiele
<10 kg	3 ml/10 kg	300 mg/kg	Kaninchen, 1 kg: 0,3 ml
10-100 kg	1 ml/10 kg	100 mg/kg	Fohlen, 75 kg: 7,5 ml
kg	0,3 ml/10 kg	30 mg/kg	Pferd, 500 kg: 15,0 ml

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Geben Sie ColicoSan unverdünnt seitlich in die Backentasche. Nötigenfalls kann die Anwendung nach einer halben bis 2 Stunden wiederholt werden. Etwa eine halbe Stunde nach der Eingabe sollte Tränkewasser zur Verfügung gestellt werden.
Im Fall einer kleinschaumigen Gärung bei Rind, Schaf und Ziege kann ColicoSan zusammen mit ca. 0,25−1 l Speiseöl eingegeben werden.

Gebrauchsanweisung zur Entnahme:



10. WARTEZEIT(EN)

Essbare Gewebe, Milch: 0 Tage

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Für dieses Tierarzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.
Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Karton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Bei sachgemässer Anwendung besteht kein Risiko bei trächtigen und laktierenden Tieren.
Für dieses Tierarzneimittel gibt es keine Untersuchungen zu Überdosierungen.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.
Fragen Sie Ihre Tierärztin / Ihren Tierarzt oder Ihre Apothekerin / Ihren Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Massnahmen dienen dem Umweltschutz.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

Diese Packungsbeilage wurde am 30.06.2026 letztmals durch die Zulassungsinhaberin aktualisiert. Keine inhaltliche Prüfung durch Swissmedic.

Weitere Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie unter www.swissmedic.ch und www.swissmedicinfo-pro.ch.

15. WEITERE ANGABEN

Pharmakotherapeutische Gruppe: Andere Medikamente für funktionelle Darmstörungen
ATCvet-Code: QA03AX

Faltschachtel mit einer 20 ml Braunglasflasche und einer Dosierspritze à 2 ml
Faltschachtel mit einer 100 ml Braunglasflasche und einer Dosierspritze à 20 ml
Faltschachtel mit einer 250 ml Braunglasflasche und einer Dosierspritze à 20 ml

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrössen in Verkehr gebracht.

Abgabekategorie E: frei verkäuflich ohne Fachberatung

Swissmedic 69180

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit der in der Rubrik 1 genannten Zulassungsinhaberin in Verbindung.