

sera med Professional **Flagellol**

DE Gebrauchsinformation

sera med Professional Flagellol ad us. vet., Lösung

Zusammensetzung

Aminonitrothiazolum 14 g

Excipients ad Solutionem pro 100 ml

Anwendungsgebiete

Generelle Anzeichen für einen Befall mit Flagellaten sind eine dunkle Färbung der Fische, eine verminderte Nahrungsaufnahme, infolgedessen nur noch Darmschleimhaut als schleimig-fädiger, weißlicher Kot abgegeben wird, eine Abmagerung der Tiere sowie Einschmelzungen der Flossenränder.

- *Spironucleus (Hexamita)* kommt im Darmtrakt von vielen Fischen vor, insbesondere bei Diskus, Skalaren und anderen Cichliden. Mit dem Kot ausgeschiedene *Spironucleus* kapseln sich am Boden des Aquariums ein.
- Eine häufige Folge massenhafter Vermehrung der Flagellaten ist die Lochkrankheit, das sind weißliche Gruben oder Läsionen in der Kopfregion.
- *Trichomonas, Bodomonas, Cryptobia* sowie *Protoopalina* können ebenfalls im Darm von Fischen auftreten.

Gegenanzeigen/Nebenwirkungen

Flagellol wird von Knorpelfischen (*Chondrichthyes*, z. B. Rochen) nicht vertragen. Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, beim behandelten Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrer Tierärztin / Ihrem Tierarzt oder Ihrer Apothekerin / Ihrem Apotheker mit.

Zieltierarten

Arzneimittel für Zierfische, ausgenommen Knorpelfische, gegen Darmflagellaten (*Spironucleus/Hexamita*) und die Lochkrankheit im Süßwasser. Lösung als Zusatz zum Aquarienwasser.

Dosierung für jede Zieltierart, Art und Dauer der Anwendung

Vor Gebrauch schütteln! 1 ml **Flagellol** je 40 Liter Aquarienwasser zugeben. Das Mittel aus dem Dosierbecher über die Wasseroberfläche verteilen und dabei mit einem Löffel oder Stab ins Aquarienwasser einrühren. Biologische Filter können angeschlossen bleiben, sollten jedoch bei starker Schmutzbelastung vor der Behandlung gereinigt werden. Dauer der Behandlung: 3 bis 7 (bei starkem Befall) Tage. Anschließend einen Wasserwechsel von mindestens 80 % zur Entfernung des Medikaments durchführen, um bakterielle Trübungen mit Sauerstoffzehrung zu vermeiden. Treten Trübungen auf, sofort 80%igen Wasserwechsel durchführen, das Medikament nachdosieren und die Behandlung bis zum Ende durchführen. Während der Behandlung für gute Durchlüftung sorgen, UV-Lampen abschalten, nicht über Aktivkohle filtern.

Besondere Lagerungshinweise

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Bei Raumtemperatur lagern (15 – 25 °C). Vor Licht schützen. Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Behältnis mit „Verwendbar bis“ angegebenen Verfallsdatum nicht mehr anwenden.

Besondere Warnhinweise

Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung bei Tieren: Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen. Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwenderin / den Anwender: Arzneimittel für Tiere. Nicht Einnehmen. Kontakt mit Augen, Haut und Schleimhäuten vermeiden. Produkt kann färbend wirken. Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen: Nicht mit anderen Arzneimitteln anwenden. **Flagellool** wird, soweit bekannt, von Garnelen und Wasserpflanzen gut vertragen.

Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Entsorgung von nicht verwendetem Arzneimittel oder von Abfallmaterialien

Angebrochene oder abgelaufene Flaschen dem Restmüll zuführen. Nicht ins Abwasser geben. Restentleerte Flaschen können einer Wiederverwendung zugeführt werden.

Genehmigungsdatum der Packungsbeilage

18. April 2024

Weitere Angaben

Flaschen zu 10 ml und 50 ml

ATCvet code: QP51AX

Abgabekategorie D: Abgabe ohne Verschreibung nach Fachberatung

Swissmedic 69825

Zugelassen im Meldeverfahren.

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit der oben genannten Zulassungsinhaberin in Verbindung.