



# Energan® Calcium

## ALIMENT COMPLÉMENTAIRE DIÉTÉTIQUE POUR VACHES LAITIÈRES; RÉDUCTION DU RISQUE DE FIÈVRE VITULAIRE ET D'HYPOCALCÉMIE SUBCLINIQUE

**COMPOSITION:** Proponiate de calcium 31,5%, Chlorure de calcium 11%, Phosphate dicalcique 2,6%, Oxyde de magnésium 0,97%, Propylène glycol 1,5%.

**CONSTITUANTS ANALYTIQUES:** Protéine brute <0,5 %, Fibres brutes 1,2%, Matières grasses brutes < 0,5%, Cendres brutes 29,05%, Calcium 12%, Sodium 0,01%, Magnésium 0,62%, Humidité 52%.

**RECOMMANDATION SUR L'ALIMENTATION:** Des premiers signes de vêlage jusqu'à deux jours après le vêlage. *En supplément calcique, donner:* 1) 1 tube d'Energan Calcium juste avant le vêlage (habituellement 2 à 6 heures avant la mise-bas) 2) 1 tube d'Energan Calcium 8 à 12 heures plus tard. *En complément d'un traitement de la fièvre vitulaire, donner:* 1) 1 tube d'Energan Calcium 2 à 4 heures après le traitement administré par le vétérinaire 2) 1 tube d'Energan Calcium 8 à 12 heures plus tard. Il est recommandé de demander l'avis d'un expert en nutrition avant d'utiliser cet aliment.

**UTILISATION:** 1. Couper l'extrémité du tube avec un couteau. 2. Visser dessus l'embout fourni. 3. Placer le tube dans le pistolet distributeur de pâte. 4. Saisir la commissure des lèvres de l'animal avec la main libre. 5. Introduire le tube dans la bouche en direction de la base de la langue. 6. Quand la gâchette du pistolet arrive au niveau des incisives, vider le tube en respectant le rythme des mouvements de déglutition de l'animal. N'administrer qu'aux animaux présentant un réflexe de déglutition normal.



**CONSERVATION:** À conserver à température ambiante, ne pas congeler. Tenir hors de la portée des enfants.

**POIDS NET:** 4080 g (12 x 340 g)

**DISTRIBUTION:** Virbac Schweiz AG, Cherstrasse 4, CH-8152 Glattbrugg (CH32462)

**FABRICANT ET RESPONSABLE DE L'ÉTIQUETAGE:**

αFR 95 355 023

Virbac, 1ère avenue 2065m LID, 06516 Carros, Frankreich FR06 033 044

*Mise à jour de l'information:* Mars 2024