

# Diakur<sup>®</sup> Plus

## Diätfuttermittel zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushalts bei Kälbern

### Inhalt

#### *Zusammensetzung*

Glukose, Zitrustrester getrocknet, Natriumchlorid, Natriumbicarbonat, Natriumacetat, Trinatriumcitrat, Hefe inaktiviert, Kaliumchlorid.

#### *Zusatzstoffe*

Lecithin (1c322) 6%, Glycin 2500 ppm

#### *Analytische Bestandteile*

Rohprotein	2,7%
Rohfett	4,5%
Rohfaser	2,6%
Rohasche	14,5%
Natrium	4,5%
Chloride	3,6%
Kalium	1,5%
Bicarbonat	2,9%
Citrat	1,9%
Glucose	56,0%

### Anwendung / Gebrauch

Diakur<sup>®</sup> Plus enthält vorwiegend Elektrolyte und leicht verfügbare Kohlenhydrate. Es wird angewendet bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall).

Für ein 50 kg schweres Kalb 100 g Diakur<sup>®</sup> Plus (1 Beutel / 2 Becher) in 2 Liter 35 - 40°C warmen Wassers anrühren und unmittelbar danach verfüttern. 2- 3 mal täglich wiederholen.

Für grösser Kälber 150 g Diakur<sup>®</sup> Plus (1,5 Beutel / 3 Becher) in 3 Litern Wasser verwenden.

In unkomplizierten Fällen kann Diakur<sup>®</sup> Plus auch mit Milch bzw. Milchaustauschern

vertränkt werden. In diesem Fall wird empfohlen, dem Kalb zwischen den Verabreichungen noch zusätzlich Wasser anzubieten.

Dauert der Durchfall länger als 48 Stunden, ist auf jeden Fall der Tierarzt hinzuzuziehen.

Fütterungsdauer: 1 - 7 Tage (1 - 3 Tage bei Alleinfütterung).

### **Sonstige Hinweise**

Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen.

Trocken und unter 30° C lagern.

### **Handelsformen**

Box mit 24 Beuteln à 100 g

Eimer à 3 kg

### **Hersteller**

Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S

208-R854833

### **Vertrieb**

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Basel

CH 32009

### **Stand der Information**

09/2017