

Diakur[®] Plus

Aliment diététique pour la stabilisation du bilan des électrolytes et de l'eau chez le veau

Contenu

Composition

Glucose, pulpe d'agrumes séchée, chlorure de sodium, bicarbonate de sodium, acétate de sodium, citrate trisodique, levure inactivée, chlorure de potassium

Additifs

Lécithine (1c322) 6%, glycine 2500 ppm

Composants analytiques

Protéine brute	2,7%
Matières grasses brutes	4,5%
Fibres brutes	2,6%
Cendres brutes	14,5%
Sodium	4,5%
Chlorures	3,6%
Potassium	1,5%
Bicarbonate	2,9%
Citrate	1,9%
Glucose	56,0%

Mode d'emploi/usage

Diakur[®] Plus contient principalement des électrolytes et des hydrates de carbone facilement assimilables. Il est utilisé en cas de risque de troubles digestifs (diarrhée), pendant et après ceux-ci.

Pour un veau de 50 kg, délayer 100 g de Diakur[®] Plus (1 sachet / 2 gobelets) dans 2 litres d'eau à 35-40°C et administrer immédiatement.

Répéter l'administration 2-3 fois par jour.

Pour des veaux plus grands, utiliser 150 g de Diakur[®] Plus (1,5 sachet / 3 gobelets) dans 3 litres d'eau.

En présence de cas non compliqués, Diakur[®] Plus peut également être donné avec du lait ou un succédané du lait. Dans ce cas, il est

recommandé d'administrer de l'eau supplémentaire entre les prises.

Si la diarrhée persiste après 48 heures, il convient dans tous les cas de consulter un vétérinaire.

Durée d'utilisation: 1 - 7 jours (1 - 3 jours si administré exclusivement).

Remarques particulières

Avant utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire.

Conserver au sec et en-dessous de 30°C.

Présentation

Box avec 24 sachets à 100 g

Seau de 3 kg

Fabricant:

Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S

208-R854833

Distributeur

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Bâle

CH 32009

Mise à jour de l'information

09/2017