

# Agivit AD<sub>3</sub>EC

Complément alimentaire liquide pour soutenir la préparation à l'œstrus et la reproduction chez les porcs, les volailles, les chevaux et les ruminants. Concentré de vitamines à forte teneur en vitamines A et D, pour l'administration à court terme par l'eau de boisson.

## Contenu

### Composition

Propylène glycol, dextrose

### Constituants analytiques

Protéines brutes	0,0 %
Fibres brutes	0,1 %
Graisses brutes	5,4 %
Cendres brutes	1,5 %
Sodium	1,4 %
Lysine	0,0 %
Méthionine	0,0 %
Humidité	75,8 %
Vitamine C	10,0 %

### Teneur en additifs par litre

#### Additifs nutritionnels

Vitamine E (3a700) de l'acétate de tocophéryle all-rac- $\alpha$	48'000 mg
Vitamine A (3a672a)	1'400'000 UI
Vitamine D <sub>3</sub> (3a671)	195'000 UI

#### Antioxydants

Ascorbate de sodium (1b301)	122'750 mg
Butylhydroxytoluène (E321)	98 mg

## Propriétés

Pour augmenter la capacité de résistance et la performance, lors de situations de stress, comme lors d'un déménagement ou d'un changement d'affouragement, ainsi que lors d'exigences de performance accrues.

## Posologie / Mode d'emploi

### Recommandation d'utilisation

Volailles :	1 litre par 1'000 litre d'eau potable
Chevaux / bovins :	40 ml par animal / jour
Poulains / veaux :	10 – 20 ml par animal / jour
Porcins :	8 ml par animal / jour

### Durée d'administration recommandée

<i>Vaches</i> :	Deux semaines avant la fin de la gestation jusqu'à confirmation de la gestation suivante.
<i>Truies</i> :	De 7 jours avant jusqu'à trois jours après la naissance et de 7 jours avant jusqu'à trois jours après l'accouplement.
<i>Jument</i> :	À partir de la dernière phase de la gestation jusqu'à confirmation de la gestation suivante.
<i>Volailles femelles</i> :	Pendant l'œstrus.
<i>Animaux mâles</i> :	Pendant l'activité de reproduction.
<i>Poulains / veaux</i> :	Si possible répartir sur plusieurs jours et ne pas nourrir en permanence.

### Conseils concernant l'administration

Cet aliment complémentaire ne peut être donné que jusqu'à 0,2 % de la ration journalière en raison des teneurs plus élevées en vitamine A et en vitamine D<sub>3</sub> par rapport aux aliments complets. L'utilisation simultanée de vitamine D<sub>2</sub> n'est pas autorisée.

Il est recommandé, avant toute utilisation d'Agivit AD<sub>3</sub>EC ou prolongation de la durée d'administration, de demander l'avis d'un expert en alimentation animale ou d'un vétérinaire.

## Autres remarques

A conserver au frais et au sec.

## Présentation

Flacon à 1000 ml

Agroscope N° :  $\alpha$  CH 32707

Mise à jour de l'information : Mai 2023