

Canikur® Pro



Aliment complémentaire diététique pour chiens et chats
Pour la stabilisation de la digestion physiologique

Composition

Huile de soja, levure inactivée, farine de lupin, glucose, chlorure de sodium, phosphate disodique, huile de tournesol

Additifs

Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) (stabilisateur de la flore intestinale):
2x10¹² CFU/kg, Bentonite 1m5581 (liant): 17 %

Composants analytiques

Matières grasses brutes	41,1 %
Cendres brutes	21,1 %
Protéines brutes	6,0 %
Fibres alimentaires brutes	1,5 %
Cendres insol. dans HCl	13,0 %

Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415):
5x10¹¹ CFU/kg

Contient une souche de bactérie probiotique naturellement présentes dans le tractus intestinal sain.

Contient aussi du Bio-Mos® - C (prébiotique), qui soutient la croissance des bactéries bénéfiques dans les intestins, et de la bentonite, un liant naturel. Bio-Mos® est une marque commerciale d'Alltech, Inc.

Mode d'emploi / usage

Doses recommandées

Chats:

1-2 ml deux fois par jour

Chiots et petits chiens (≤ 10 kg):

2 ml deux fois par jour

Chiens moyens (11-25 kg):

4 ml deux fois par jour

Grands chiens (26-40 kg)

6 ml deux fois par jour

Très grands chiens (> 40 kg):

8 ml deux fois par jour

Tournez l'anneau sur la seringue doseuse jusqu'au dosage souhaité et administrez la pâte Canikur® Pro dans l'écuelle ou directement dans la gueule de l'animal. N'administrez pas plus que la dose recommandée.

Il est recommandé de remettre le capuchon sur l'embout après utilisation afin d'éviter la formation d'un bouchon de pâte sèche.

Il est recommandé de demander conseil à un vétérinaire avant utilisation.

Durée d'utilisation

Utilisez le produit aussi longtemps que nécessaire ou qu'indiqué par le vétérinaire, sans dépasser quatre semaines.

Utilisez le produit pour favoriser et maintenir une flore intestinale saine lorsqu'il existe un risque de troubles digestifs (diarrhée), pendant ce type de troubles ou lorsque l'animal récupère à la suite de tels troubles. Particulièrement utile en période de stress, au cours d'un traitement antibiotique ou dans toute autre situation susceptible de perturber la flore bactérienne naturelle des intestins.

La bentonite pouvant fixer les macrolides, l'utilisation orale du produit en même temps que des macrolides doit être évitée.

Conservation

À conserver au sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur.

Présentation

Emballage contenant 1 seringue pour administration orale à 15 ml ou 30 ml.

Fabricant

Boehringer Ingelheim
Animal Health
αGB2800019

Distributeur

Boehringer Ingelheim
(Schweiz) GmbH, Bâle
CH 32009

10/2017